

UN ATTO D'AMORE PER IL TUO BAMBINO



PROTEGGILO DALLA PERTOSSE


Vaccino pertosse (SISP.DO.4137.00)



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

COS'È LA PERTOSSE?



La pertosse è una malattia infettiva altamente contagiosa causata dal batterio *Bordetella Pertussis*; si manifesta prima con tosse catarrale e poi secca più intensa che può portare a gravi difficoltà respiratorie e crisi di apnea. Abbiamo a disposizione un vaccino efficace e sicuro che protegge dalla pertosse.

Tuttavia i neonati non possono ricevere tale vaccino prima del compimento del secondo mese di vita e quindi, nelle prime settimane dopo la nascita, sono a maggior rischio di malattia e delle possibili complicanze.

VACCINAZIONE IN GRAVIDANZA

Attualmente, tra le strategie per ridurre i rischi di pertosse nel neonato, la vaccinazione della mamma durante la gestazione risulta essere la più efficace: infatti, oltre a proteggere la gestante, gli anticorpi prodotti dalla vaccinazione materna vengono trasferiti al bambino prima della nascita, proteggendolo fino al momento in cui potrà ricevere la prima dose del vaccino.

IL VACCINO IN GRAVIDANZA È SICURO?

Numerosi studi scientifici, così come il Ministero della Salute, riportano evidenze scientifiche sulla sicurezza del vaccino in gravidanza, sia per il feto che per la gestante. Gli eventuali effetti indesiderati sono lievi e transitori: gonfiore, dolore e rossore nel sito dell'iniezione. Raramente febbre o cefalea.

STRATEGIA COCOON

"del BOZZOLO"



Oltre alla vaccinazione materna in gravidanza, si dovrebbe fornire al neonato un'ulteriore protezione verso la pertosse grazie alla "Strategia Cocoon", o strategia del bozzolo, che consiste nella vaccinazione di tutte le persone che entreranno in stretto contatto con il neonato.

Diversi studi hanno infatti dimostrato che la fonte più frequente di infezione da Bordetella Pertussis per il neonato sono i familiari e più in generale tutte le persone che si occupano dell'accudimento (genitori, fratellini, nonni, baby sitter,...).

QUALE VACCINO È DISPONIBILE?

Il vaccino contro la pertosse viene somministrato insieme a quelli contro difterite e tetano (dTp), in un'unica iniezione.

Il vaccino, raccomandato dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, è offerto gratuitamente in tutti i centri vaccinali e può essere somministrato tra la 27^a e 36^a settimana di gestazione. Tale vaccinazione va ripetuta a ogni gravidanza, anche in caso di vaccinazione già effettuata in precedenza o di pregressa malattia naturale.

La vaccinazione delle persone che potranno essere fonte di infezione (familiari, ecc) dovrebbe essere effettuata almeno due settimane prima del presunto stretto contatto con il neonato. Questo perché la produzione di anticorpi è rapida e raggiunge il picco massimo entro due settimane dalla vaccinazione.





S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica SISP ASL di Vercelli

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi presso le sedi vaccinali dell'ASL di
Vercelli o inviare una mail all'indirizzo:

vaccinazioni@aslvc.piemonte.it

*Rielaborazione e realizzazione grafica a cura del S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del
S.D.U. Osservatorio Epidemiologico ASL VC*



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli