



offerta della vaccinazione anti Zoster in Regione Piemonte

Le raccomandazioni emanate dalla Regione Piemonte (DD 1823/A1409B/2021 del 08.09.2021) sull'uso dei due vaccini sono riassunte nella tabella seguente:

CONDIZIONE DI RISCHIO	VACCINO ZOSTAVAX	VACCINO SHINGRIX
Soggetti nati nel 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 mai vaccinati senza altre condizioni di rischio	<input type="checkbox"/>	
Soggetti con Diabete mellito dai 18 anni		<input type="checkbox"/>
Soggetti con Patologia cardiovascolare dai 18 anni		<input type="checkbox"/>
Soggetti con BPCO e asma bronchiale dai 18 anni		<input type="checkbox"/>
Soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva dai 18 anni		<input type="checkbox"/>
Soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster dai 18 anni		<input type="checkbox"/>

Quali soggetti possono essere vaccinati dal MMG?

- I soggetti con condizioni di rischio (elenco di cui sopra) se allettati o comunque impossibilitati a muoversi possono essere vaccinati dai propri MMG (in questo caso il ritiro del vaccino viene effettuato in farmacia);
- I soggetti nati nel 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957
- I soggetti con cardiopatie croniche o malattie polmonari croniche.

In tutte le altre situazioni, ovvero tutti i soggetti che non rientrano nell'offerta gratuita, le Vaccinazioni sono offerte a prezzo di costo presso i servizi vaccinali delle ASL

Quando vaccinare?

Sempre, durante tutto l'anno

Controindicazioni alla vaccinazione

Per Shingrix e Zostavax:

Anamnesi di ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti oppure a tracce di residui (ad es. neomicina); un'anamnesi di dermatite da contatto dovuta alla neomicina non è una controindicazione alla vaccinazione con vaccini a virus vivo. Non ci sono dati riguardanti l'uso di Shingrix nelle donne in gravidanza.

Per Zostavax:

- Immunodeficienza: leucemie acute e croniche, linfoma, altre patologie del midollo osseo o del sistema linfatico; immunosoppressione da HIV/AIDS; deficienze immunitarie cellulari.
 - Terapia immunosoppressiva, inclusi corticosteroidi ad alto dosaggio. Non è controindicato in caso di assunzione di corticosteroidi per via topica o inalatoria oppure corticosteroidi sistemici a basso dosaggio o corticosteroidi per terapia sostitutiva.
 - Gravidanza
 - Tubercolosi attiva non trattata.
-