

## SOLUZIONI PROVA SCRITTA N.3 (Allegato N.3)

1. **Quali interventi sono da associare alla terapia farmacologica secondo le più recenti linee guida internazionali e nazionali per la cura della persona con malattia di Parkinson?**
  - a. Educativi
  - b. Supporto psicologico e sociale
  - c. Attività fisica
  - d. **Tutte le risposte precedenti sono corrette**
  
2. **Quali muscoli s'inseriscono nella zampa d'oca?**
  - a. Semimembranoso, semitendinoso e sartorio
  - b. **Sartorio, gracile e semitendinoso**
  - c. gracile, semimembranoso, semitendinoso e sartorio
  - e. gracile, semimembranoso e semitendinoso
  
3. **Il D.lgs 196/2003 ha introdotto il codice:**
  - a. Di Sanità Pubblica
  - b. **Della Privacy**
  - c. Della Carta dei Servizi Sanitari
  - d. Dei Diritti del Malato
  
4. **Ai pazienti con Low Back Pain acuto a livello internazionale cosa è raccomandato: (NUOVA)**
  - a. Usare un bustino
  - b. Stare a letto per qualche giorno
  - c. **Rimanere attivi nella vita quotidiana**
  - d. Nessuna delle precedenti
  
5. **Quale tra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?**
  - a. **Frattura sottocapitata**
  - b. Frattura pertrocanterica
  - c. Frattura sottotrocanterica
  - d. Tutte le fratture citate
  
6. **Il clono si manifesta in pazienti che abbiano avuto una lesione:**
  - a. Delle fibre 1b contenute nei fusi neuro muscolari
  - b. **Del Sistema Nervoso Centrale**
  - c. Del Sistema Nervoso Periferico
  - d. Degli organi muscolo-tendinei del Golgi
  
7. **A quale articolazione si riferiscono l'apprehension test ed il relocation test?**
  - a. Polso
  - b. Caviglia
  - c. **Spalla**
  - d. Ginocchio

8. **Che tipo di articolazione è la trapezio-metacarpale:**
- a. A troclea
  - b. A sella**
  - c. Sferica
  - d. Piana
9. **Qual è la prova classica per evidenziare la presenza di adiadococinesia?**
- a. La prova indice-naso
  - b. La prova tallone-ginocchio
  - c. La prova di Romberg
  - d. La prova prono supinazione**
10. **L'ELTGOL è:**
- a. Un incentivatore di flusso
  - b. Un incentivatore di volume
  - c. Una tecnica di disostruzione bronchiale**
  - d. Una complicanza della Fibrosi Cistica
11. **Quando deve essere somministrata la scala Barthel:**
- a. All'atto del ricovero in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)
  - b. All'atto del ricovero in ospedale
  - c. All'atto del ricovero e della dimissione dall'ospedale**
  - d. All'atto della dimissione dall'ospedale
12. **Paziente con il capo in estensione:**
- a. Deglutisce senza far uscire i liquidi dalla bocca
  - b. Deglutisce ma non vede l'interlocutore
  - c. Non riesce a deglutire correttamente**
  - d. Cerca questa posizione per la debolezza muscolare
13. **Il tremore intenzionale compare:**
- a. Durante il movimento evocato dalle emozioni
  - b. Al termine dello sforzo
  - c. Al risveglio
  - d. Durante il movimento, ha caratteristica di lentezza si distingue dal tremore a riposo**
14. **Quando si usa la scala MMRC?**
- a. Per valutare manualmente la muscolatura. Calcola la forza residua
  - b. Per valutare la misura della media percorsa nella corsa
  - c. Per valutare il numero di eventi dispnoici in un paziente a rischio
  - d. Per valutare il punteggio della dispn**
15. **Il segno del Trendelenburg è dovuto a:**
- a. Lesione del legamento crociato posteriore
  - b. Lombosciatalgia con interessamento radicolare di S1

- c. **Insufficienza della muscolatura glutea**
- d. Lesione della cuffia dei rotatori della spalla

**16. Un paziente affetto da Sclerosi Multipla può presentare segni di tipo:**

- a. Piramidale
- b. Cerebellare
- c. Vestibolare
- d. **Tutte le alternative precedenti sono corrette**

**17. È possibile che le reazioni di paracadute ed equilibrio siano distribuite in modo non uniforme?**

- a. No perché sono a controllo corticale
- b. No perché sono a controllo spinale sottocorticale
- c. Sì solo per il lato colpito in caso di lesione neurologica
- d. **Sì per il lato, la posizione del corpo nello spazio, sopra-sotto, davanti e dietro.**

**18. La perdita di saliva in un paziente con disturbi della deglutizione è indicativa di:**

- a. **Lesione del VII nervo cranico**
- b. Ipertonia della muscolatura respiratoria e alterazione della sensibilità
- c. Alterazione del riflesso della tosse e lesione del VII nervo cranico
- d. Lesione del VII nervo cranico e ipertonia della muscolatura respiratoria

**19. Cosa s'intende per posizione declive:**

- a. Quando il soggetto è in posizione supina su un piano inclinato di 40°/50° in modo che il capo sia più in alto rispetto al bacino e agli arti inferiori
- b. Quando il soggetto è in posizione supina su un piano inclinato di 40°/50° in modo che il capo sia più in basso rispetto al bacino e agli arti inferiori
- c. Quando il soggetto è in posizione supina su un piano inclinato di 20°/30° in modo che il capo sia più in alto rispetto al bacino e agli arti inferiori
- d. **Quando il soggetto è in posizione supina su un piano inclinato di 20°/30° in modo che il capo sia più in basso rispetto al bacino e agli arti inferiori**

**20. Il muscolo tensore della fascia lata è:**

- a. Estensore
- b. Abduuttore
- c. Adduttore
- d. **Flessore**

**21. Nella spasticità c'è:**

- a. Iperattività del riflesso di stiramento
- b. Tutte le risposte sono corrette**
- c. Fenomeno del coltello a serramanico
- d. Aumento della resistenza ai movimenti passivi rapidi

**22. Cosa causa la paralisi dello sciatico popliteo esterno (SPE):**

- a. Un deficit di flessione del piede e delle dita
- b. Un deficit di flessione del ginocchio
- c. Un deficit di estensione del piede e delle dita**
- d. Un deficit di estensione del ginocchio

**23. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola: (NUOVA)**

- a. Gran dorsale
- b. Gran dentato**
- c. Romboide
- d. Deltoide posteriore

**24. Quali item sono contenuti nella BADL?**

- a. Fare il bagno, vestirsi, toilette, spostarsi, continenza urinaria e fecale, alimentarsi**
- b. Fare il bagno, vestirsi, spostarsi, continenza urinaria e fecale, alimentarsi, fare la spesa
- c. toilette, vestirsi, spostarsi, continenza urinaria e fecale, alimentarsi, telefonare
- d. toilette, vestirsi, spostarsi, prepararsi il cibo, alimentarsi, continenza.

**25. L'articolazione radio-ulnare è:**

- a. Una troclea
- b. A sella
- c. Trocoide**
- d. Piana

**26. Quale livello di sviluppo è necessario per la manipolazione e l'uso funzionale degli arti superiori?**

- a. La liberazione dalla necessità di appoggio**
- b. Lo sviluppo dei movimenti fini da seduto
- c. La coordinazione con il tronco nelle rotazioni
- d. Il controllo del capo sul tronco

**27. Quando un paziente non riesce ad identificare quale dito della mano si tocca si parla di disturbo della:**

- a. Sensibilità cinestesica
- b. Sensibilità tattile protopatica
- c. Sensibilità propriocettiva
- d. Sensibilità tattile epicritica**

**28. In una frattura di bacino quale è la principale terapia nella fase iniziale:**

- a. Immobilizzazione con apparecchio gessato
- b. Immobilizzazione a letto**
- c. Mobilizzazione cauta
- d. Nessuna delle precedenti

**29. Quali sono le complicanze tardive più frequenti di una frattura del collo del femore:**

- a. Limitazione del range articolare
- b. Dolore persistente all'anca
- c. Rigidità articolari
- d. Necrosi della testa e pseudo artrosi**

**30. Quali sono i fattori di rischio di caduta:**

- a. Fattori estrinseci
- b. Fattori intrinseci
- c. Fattori estrinseci ed intrinseci**
- d. Nessuna delle precedenti

