PROVA 1

NON ESTRATTA Alice Giacchetta

1)Secondo il decalogo UNICEF – OMS per l'allattamento al seno, la preparazione del personale deve rivolgersi:

[a] solo alle ostetriche ed ai ginecologi

[b] solo alle ostetriche

[c] a tutto il personale

[d] a tutto il personale tranne la figura dell'infermiere

2) Che cosa è un galattocele?

[a] Prolasso dei dotti galattofori

[b] Cisti mammaria da raccolta lattea

[c] Incapacità di allattare

[d] Nessuna delle precedenti

3) Dopo quanto tempo dal parto l'utero riprende le dimensioni pregravidiche ?

[a] 6 settimane

[b] 8 settimane

[c] 10 settimane

[d] 14 settimane

4) Nel primo trimestre di gravidanza la produzione di progesterone è affidata a:

[a] sincizio e corpo luteo

[b] sincizio e corpo luteo gravidico

[c] corpo luteo gravidico e placenta

[d] nessuna delle precedenti

5) Quale di questi parametri non è considerato nello score di Bishop?

[a] Dilatazione della cervice

[b] Lunghezza della cervice

[c] Posizione della cervice

[d] Presentazione fetale

6) Si parla di febbre remittente quando:

[a] la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono al di sopra della norma

[b] la temperatura si mantiene costantemente elevata con variazioni contenute nell'ordine di 1 grado

[c] a periodi di febbre elevata si alternano periodi di completa apiressia

PROVA 1

[d] nessuna delle precedenti

7)Quale delle seguenti non è una indicazione assoluta al TC?

[a] Sproporzione feto–pelvica (peso stimato 4.800 g)

[b] TC pregresso

[c] Liquido amniotico tinto M3 nel primo stadio del travaglio (alterazioni BCF)

[d] Nessuna delle precedenti

8) Qual è il trattamento chirurgico primario per una cisti del Bartolini ascessualizzata?

[a] Incisione / drenaggio

[b] Drenaggio / marsupializzazione

[c] Incisione / drenaggio / marsupializzazione

[d] Nessuna delle precedenti

9) Quale delle seguenti non è un'indicazione alla B-Lynch?

[a] Coagulopatie

[b] Placenta percreta

[c] Emorragie per atonie uterine

[d] Nessuna delle precedenti

10)La datazione della gravidanza va corretta:

[a] Tutte le volte che lo specialista lo ritiene opportuno

[b] Nel III trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o > di 1 settimana

[c] Nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è < di 2 settimane

[d] Nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o > di 1 settimana

11)Una donna nullipara a 40 settimane di gestazione in travaglio spontaneo viene sottoposta a TC per sofferenza fetale: in quale classe di Robson rientra l'intervento?

[a] I

[b] III

[c] V

[d] X

12) In menopausa la secchezza delle mucose vaginali è generalmente dovuta:

[a] Alla riduzione dello stimolo estrogenico

[b] All'assenza di progesterone

PROVA 1

[c] Alla riduzione del desiderio sessuale

[d] nessuna delle precedenti

13) In ecografia il brain sparing indica:

[a] malformazione cerebrale

[b] riduzione delle resistenze vascolari cerebrali

[c] aumento delle resistenze vascolari cerebrali

[d] nessuna delle precedenti

14) La metilergometrina è:

[a] Alcaloide

[b] Digitalico

[c] Oppioide

[d] Tutte le precedenti

15) Tra i seguenti cariotipi, la sindrome di Turner è rappresentata da:

[a] 46 XY

[b] 46 00

[c] 45 X0

[d] Nessuna delle precedenti

16) Il rischio di interrompere una gravidanza in seguito ad amniocentesi è:

[a] dell'1%

[b] del 2 %

[c] compreso tra 0,1 – 0,5 %

[d] nessuna delle precedenti

17) Il segno di Piskaczeck, per la diagnosi di gravidanza, è un segno di:

[a] presunzione

[b] probabilità

[c] certezza

[d] nessuna delle precedenti

18) Quale articolo del codice penale prevede il reato di rivelazione di segreto professionale?

[a] Art. 326 c.p.

[b] Art. 622 c.p.

[c] Art. 348 c.p.

[d] Nessuna delle precedenti

19) Secondo le linee guisa SIGO quali sono i dosaggi del misoprostolo per l'induzione del travaglio di parto a termine di gravidanza?

[a] orale: 50-100 mcg. ogni 3-6 ore, fino a un massimo di 3 dosi

[b] orale: 50-100 mcg. ogni 2 ore, fino a un massimo di 6 dosi

[c] orale: 50-100 mcg. ogni 3-6 ore, fino a un massimo di 6 dosi

[d] orale: 50-100 mcg. ogni 2 ore, fino a un massimo di 3 dosi

20) Cosa è necessario monitorare nell'ittero grave da malattia emolitica del neonato?

[a] La transaminasi

[b] La bilirubina

[c] La protidemia

[d] Nessuna delle precedenti

21) In quale delle seguenti condizioni è presente l'assistenza del neonatologo in sala parto?

[a] Sofferenza fetale acuta

[b] Distocia di spalla

[c] In entrambe le precedenti ipotesi

[d] Nessuna delle precedenti

22) Tra i seguenti marcatori tumorali, quale ha una maggiore specificità per le patologie mammarie?

[a] CEA

[b] CA 15-3

[c] PSA

[d] Nessuna delle precedenti

23) La pPROM è la rottura delle membrane che avviene:

[a] in travaglio

[b] < 35 W

[c] < 37 W

[d] > 37 W

24) La presentazione podalica completa è:

[a] Natiche e piedi

[b] Ginocchia

[c] Solo piedi

[d] nessuna delle precedenti

25) La membrana placentare interna è:

[a] il corion

[b] l'amnios

[c] il sacco vitellino

[d] nessuna delle precedenti

26) Che cos'è il piano perineale:

[a] E' l'insieme di tessuti molli, muscoli e fibre che chiude il bacino nel suo distretto inferiore

[b] è la parte inferiore del muscolo diaframmatico

[c] è un tessuto unico che sorregge la vescica

[d] nessuna delle altre risposte è corretta

27) Quale delle seguenti condizioni candidano una donna per l'OGTT a 16-18 settimane?

[a] GDM in una gravidanza precedente

[b] BMI $\geq$ 25

[c] Tutte le precedenti

[d] Nessuna delle precedenti

28) Nella placenta increta, i villi penetrano:

[a] La parete uterina a tutto spessore

[b] Solo endometrio e miometrio

[c] Solo il miometrio

[d] Nessuna delle precedenti

29) In caso di attacco eclamptico cosa si rende necessario fare?

[a] Taglio cesareo d'urgenza

[b] Espletamento del parto indipendentemente dalla metodica

[c] Stabilizzare le condizioni della donna e del feto

[d] Nessuna delle precedenti

30) Secondo l'algoritmo assistenziale, in caso di distocia di spalla, la manovra di Gaskin è indicata:

[a] Nei casi di ridotta mobilità della paziente

PROVA 1

[b] Nei casi in cui la donna si trovi in posizioni alternative (accovacciata, sgabello, in piedi)

[c] E' sempre consigliata

[d] Nessuna delle precedenti