



REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 5 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI – PROFILO DI INFERMIERE.**

24/08/2023

PROVA PRATICA n. 2

¹1. Indicare, nello spazio predisposto, cosa indica il cartello:



2. Alla Sig.ra Laura vengono somministrati 500 mg di claritromicina ogni 8 ore, quanti grammi di farmaco assumerà nelle 24 ore:

- a. 500 gr
- b. 1,5 gr
- c. 0.150 gr
- d. 150 gr

3. Qual è il PH del sangue nell'individuo normale

- a. 4.5 – 5.5
- b. 7.35 – 7.40
- c. 7.5 – 7.6
- d. 6.5 – 6.8

4. In quale dei seguenti casi si applica una scala di misurazione quantitativa discreta?

- a. Frequenza cardiaca
- b. Temperatura corporea
- c. Peso corporeo
- d. Rischio di lesioni da pressione

5. Sapendo che 1 g. di glucosio fornisce 4 calorie, quante calorie si somministrano con 500 ml di soluzione glucosata al 5%?

Prova Pratica n. 2

Prova Pratica n. 2

- a. 50 calorie
- b. 100 calorie
- c. 500 calorie
- d. 10 calorie

6. Un *near miss event* è:

- a. Un evento avverso evitato grazie all'intervento di una macchina
- b. Un evento avverso evitato
- c. Un evento avverso grave evitato grazie all'intervento dell'uomo
- d. Un evento avverso evitabile

7. Quali sono i valori limiti imposti dalla legge per il sollevamento dei carichi?

- a. 35 Kg per gli uomini, 25 Kg per le donne
- b. 25 Kg per gli uomini, 15 Kg per le donne
- c. 30 Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne
- d. 30 kg per gli uomini, 15 per le donne

8. Cosa deve essere riportato sul contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo prima del suo allontanamento dal reparto?

- a. La tipologia del materiale smaltito
- b. Il reparto/servizio, ASL e la data di confezionamento
- c. La tipologia del materiale smaltito, il reparto-servizio, nome ASL e la data di confezionamento
- d. Il reparto-servizio, nome ASL, la data di confezionamento e la sigla dell'operatore che ha confezionato il contenitore

9. Quale tra i seguenti dati raccolti durante l'accertamento infermieristico, non è un dato soggettivo:

- a. il respiro dopo l'esame rx è affannoso
- b. quando mi sdraio non respiro bene
- c. la pressione arteriosa a digiuno è elevata
- d. dal referto dell'Rx Torace si rileva "polmonite basale dx"

10. Come si calcola l'indice di massa corporea (Body Mass Index):

- a. Moltiplicando l'altezza per il peso e dividendo per 2
- b. Dividendo il peso in Kg per l'altezza in metri quadrati

- c. Sottraendo al peso metà dell'altezza e dividendo per 2
- d. addizionando l'altezza al peso e moltiplicando per 2

11. L'assistito deve essere sottoposto all'indagine radiologica denominata Rx Torace, a seguito di trauma da incidente stradale. A quale tipo di preparazione deve essere sottoposto prima dell'indagine:

- a. deve essere idratato con almeno 750 ml di liquidi
- b. deve assolutamente essere digiuno
- c. non è necessaria alcuna preparazione
- d. deve presentarsi a stomaco pieno

12. A seguito della rimozione del catetere vescicale, che cosa è necessario valutare?

- a. la ripresa della minzione spontanea e le caratteristiche dell'urina
- b. la ripresa della minzione spontanea entro 12 ore dalla rimozione del catetere vescicale
- c. comparsa di globo vescicale e dolore entro le 3 ore successive alla rimozione del catetere
- d. evitare di rilevare il dolore in quanto è normale provare bruciore, dolore alla minzione e rialzo termico alla rimozione del catetere vescicale

13. Indicare, nello spazio predisposto, cosa indica il cartello:



14. Per analisi colturale delle urine, il campione deve provenire da:

- a. campione da mitto iniziale
- b. campione da mitto intermedio
- c. campione urine da raccolta delle 24 ore
- d. campione da mitto terminale

15. Al Sig. Antonio è stato prescritto il farmaco "furosemide 160 mg" per via orale. Nella struttura ospedaliera il farmaco è presente in compresse (cps.) da 40 mg ciascuna. Quante compresse devono essere somministrate al Sig. Antonio?

- a. 2 cps.
- b. 8 cps.
- c. 4 cps.
- d. 5 cps.

16. Nella pratica quotidiana, quando si indossano i guanti, l'igiene delle mani deve essere effettuato:

- a. prima di indossarli
- b. dopo averli rimossi
- c. prima e dopo averli indossati
- d. dopo contatto con liquidi biologici

17. Per l'esecuzione dell'Elettrocardiogramma, in quale sede deve essere posizionato l'elettrodo per la rilevazione della derivazione precordiale toracica V2:

- a. quarto spazio intercostale linea parasternale sinistra
- b. quinto spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra
- c. quarto spazio intercostale linea parasternale destra
- d. quinto spazio intercostale sulla linea ascellare media sinistra

18. Nell'E.C.G., per la registrazione delle derivazioni periferiche, l'elettrodo giallo dove deve essere posizionato?

- a. Arto superiore dx
- b. Arto inferiore dx
- c. Arto inferiore sx
- d. Arto superiore sx

19. Si definisce emivita di un farmaco:

- a. Il tempo durante il quale si riduce la concentrazione rilevabile all'interno del torrente circolatorio
- b. La concentrazione rilevabile all'interno del torrente circolatorio ridotta della metà entro 8 ore dalla somministrazione
- c. La concentrazione rilevabile all'interno del torrente circolatorio ridotta della metà nell'arco di 4 ore dalla somministrazione e non oltre le 12
- d. Il tempo durante il quale si riduce della metà la concentrazione rilevabile all'interno del torrente circolatorio

20. La complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale è:

- a. Il vomito
- b. Il vomito associato a ipoglicemia
- c. L'infezione
- d. L'improvvisa ipoglicemia o iperglicemia

