



REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI INFERMIERE.

**24/08/2023**

**PROVA PRATICA n. 1**



<sup>2</sup>1. Indicare, nello spazio predisposto, la corretta denominazione del cartello rappresentato nell'immagine sottostante:



2. Per l'effettuazione di un esame urine con strisce reagenti, che tipologia di campione urine è necessario prelevare:

- a. campione urine sterile da catetere
- b. campione urine casuale
- c. campione urine da raccolta delle 24 ore
- d. campione urine da mitto intermedio

4. Per la valutazione dello stato di coscienza di un assistito, è necessario:

- a. utilizzare la scala Painad
- b. utilizzare la GCS
- c. utilizzare la scala A.DI.CO.
- d. utilizzare la M.M.S.E.

3. Quale precauzione deve essere adottata nei confronti di un neonato che deve essere sottoposto a fototerapia:

- a. protezione oculare
- b. protezione del corpo con indumenti in fibra di cotone e protezione oculare
- c. protezione del capo per evitare dispersione di calore
- d. protezione degli arti per evitare possibili ustioni

5. Quando si rende necessario far assumere all'assistito la posizione di Fowler o semi Fowler:

- a. per prevenire l'edema agli arti inferiori
- b. per facilitare gli interventi ginecologici
- c. per facilitare le manovre di Valsala

d. per promuovere l'espansione toracica

6. Indicare, nello spazio predisposto, la corretta denominazione dell'ausilio rappresentato nell'immagine sottostante:



7. Quale tra i seguenti dati raccolti durante l'accertamento infermieristico, non è un dato oggettivo:

- a. temperatura rilevata alle ore 21 pari a 39°C
- b. respiro affannoso e dispnoico rilevato durante auscultazione toracica
- c. valore pressorio pari a 130/75 mmHg rilevato alle ore 10
- d. affaticamento grave enunciato dal paziente alle ore 21

8. Tra gli alimenti sottoelencati, quali NON sono consigliati per un Assistito affetto da disfagia:

- a. omogenizzati
- b. fette biscottate e biscotto tipo "Plasmon"
- c. acqua gelificata, mousse di frutta
- d. purè di patate

9. Per un prelievo venoso dall'arto superiore, generalmente, è preferibile effettuare la venipuntura su quali vasi:

- a. Ulnare o Radiale
- b. cubitale mediana e basilica
- c. femorale e cubitale mediana
- d. radiale

10. La Scala di Norton è:

- a. uno strumento che permette l'individuazione del rischio di infezione correlata all'assistenza
- b. uno strumento che permette la valutazione del rischio di danno cognitivo dell'assistito
- c. uno strumento che permette d'individuare l'assistito a rischio caduta a seguito di incidente stradale

d. uno strumento che permette di individuare gli assistiti a rischio di lesione da pressione

**11. Per l'esecuzione dell'Elettrocardiogramma, in quale sede deve essere posizionato l'elettrodo per la rilevazione della derivazione precordiale toracica V1:**

- a. quinto spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra
- b. quarto spazio intercostale linea parasternale sinistra
- c. quarto spazio intercostale linea parasternale destra
- d. quinto spazio intercostale sulla linea ascellare anteriore sinistra

**12. Nell'E.C.G., per la registrazione delle derivazioni periferiche, l'elettrodo rosso dove deve essere posizionato?**

- a. Arto superiore dx
- b. Arto inferiore dx
- c. Arto inferiore sx
- d. Arto superiore sx

**13. La disinfezione di cute, oggetti e superfici si ottiene con**

- a. L'uso di gel alcolici
- b. L'impiego di disinfettanti preceduto dalla pulizia
- c. L'impiego di disinfettanti specifici a ph neutro
- d. L'uso di prodotti sanificanti preceduto dalla pulizia

**14. Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura:**

- a. Falciante
- b. Anserina
- c. Steppante
- d. Emiplegica

**15. In un paziente allettato, mantenuto in posizione laterale, indicare alcune tra le sedi anatomiche più a rischio di sviluppare una lesione da pressione:**

- a. orecchio, occipite, trocantere, condilo-medio laterale, malleolo medio-laterale, tallone
- b. orecchio, processo dell'acromion, trocantere, sacro, malleolo medio-laterale, tallone
- c. orecchio, processo dell'acromion, trocantere, condilo-medio laterale, ischio, tallone
- d. orecchio, processo dell'acromion, trocantere, condilo-medio laterale, malleolo medio-laterale, tallone

**16. Per quale delle seguenti malattie a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino?**

- a. Epatite A
- b. Epatite B
- c. Toxoplasmosi
- d. Morbillo

**17. La procedura:**

- a. Definisce la sequenza dei comportamenti diagnostico-terapeutici ben definiti che risulta dall'adattamento delle Linee Guida
- b. E' lo strumento di integrazione orizzontale tra professionisti che li redigono su basi scientifiche ed esperienziali e possono essere impiegati solamente nello stesso contesto nel quale vengono elaborati
- c. Definisce la sequenza di azioni tecnico-operative eseguite dal professionista e rappresenta l'unita' elementare del processo assistenziale
- d. E' un documento aziendale interno che regola le procedure interne di un'organizzazione

**18. Per somministrare 125 mg di antibiotico per via intramuscolare, in presenza di una fiala da 4 ml contenente 500 mg di farmaco, quanti ml si dovranno prelevare:**

- a. 0,5 ml di antibiotico
- b. 1,3 ml di antibiotico
- c. 1,6 ml di antibiotico
- d. 1 ml di antibiotico

**19. La visiera facciale, viene utilizzata nello svolgimento delle attività assistenziali, ed è definita:**

- a. Dispositivo di Protezione Individuale rischio biologico
- b. Dispositivo di Protezione Individuale da infezioni causate da *droplet*
- c. Dispositivo di Protezione Individuale
- d. Dispositivo di Protezione Individuale da infezioni causate da *droplet* nuclei

**20. In un paziente affetto da cirrosi epatica la dieta indicata è:**

- a. Iperglucidica, iperproteica
- b. iposodica, ipoproteica
- c. Iperlipidica, ipocalorica
- d. Iperproteica, ipocalorica



