



REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 5 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI – PROFILO DI INFERMIERE.**

24/08/2023

PROVA PRATICA n. 4

1. Indicare, nello spazio predisposto, la corretta denominazione del cartello rappresentato nell'immagine sottostante:



2. Per somministrare 125 mg di antibiotico per via intramuscolare, in presenza di una fiala da 4 ml contenente 500 mg di farmaco, quanti ml si dovranno prelevare:

- a. 0,5 ml di antibiotico
- b. 1,3 ml di antibiotico
- c. 1,6 ml di antibiotico
- d. 1 ml di antibiotico

3. Tra gli alimenti sottoelencati, quali NON sono consigliati per un Assistito affetto da disfagia:

- a. omogenizzati
- b. fette biscottate e biscotto tipo "Plasmon"
- c. acqua gelificata, mousse di frutta
- d. purè di patate

4. La Scala di Norton è:

- a. uno strumento che permette l'individuazione del rischio di infezione correlata all'assistenza
- b. uno strumento che permette la valutazione del rischio di danno cognitivo dell'assistito
- c. uno strumento che permette d'individuare l'assistito a rischio caduta a seguito di incidente stradale
- d. uno strumento che permette di individuare gli assistiti a rischio di lesione da pressione

5. L'utilizzo del catetere PICC è indicato per:

- a. terapia endovenosa estemporanea
- b. terapia endovenosa superiore ai 3 giorni in soggetto con depauperamento del patrimonio venoso
- c. terapia endovenosa superiore a 6 giorni
- d. terapia endovenosa estemporanea discontinua inferiore ai 3 giorni

6. Quando si rende necessario far assumere all'assistito la posizione di Fowler o semi Fowler:

- a. per prevenire l'edema agli arti inferiori
- b. per facilitare gli interventi ginecologici
- c. per facilitare le manovre di Valsalva
- d. per promuovere l'espansione toracica

7. Indicare, nello spazio predisposto, cosa indica il cartello:



8. Per analisi colturale delle urine, il campione deve provenire da:

- a. campione da mitto iniziale
- b. campione da mitto intermedio
- c. campione urine da raccolta delle 24 ore
- d. campione da mitto terminale

9. Attraverso la Scala di Braden viene rilevato un valore pari a 6. Si può affermare che l'Assistito:

- a. l'Assistito è a rischio caduta
- b. l'Assistito è a rischio malnutrizione
- c. l'Assistito è a rischio lesione da pressione
- d. L'Assistito è a rischio disidratazione

10. Nella pratica quotidiana, quando si indossano i guanti, l'igiene delle mani deve essere effettuato:

- a. prima di indossarli
- b. dopo averli rimossi
- c. prima e dopo averli indossati
- d. dopo contatto con liquidi biologici

11. Per l'esecuzione dell'Elettrocardiogramma, in quale sede deve essere posizionato l'elettrodo per la rilevazione della derivazione precordiale toracica V4:

- a. quarto spazio intercostale linea parasternale destra
- b. quinto spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra
- c. quinto spazio intercostale sulla linea ascellare media sinistra
- d. quarto spazio intercostale linea parasternale sinistra

12. Nell'E.C.G., per la registrazione delle derivazioni periferiche, l'elettrodo nero dove deve essere posizionato?

- a. Arto superiore dx
- b. Arto inferiore dx
- c. Arto inferiore sx
- d. Arto superiore sx

13. Nella valutazione dell'assistito si rileva un'andatura elicopode/falciante, indicare la risposta corretta:

- a. L'andatura elicopode è tipica dell'emiparesi da ictus ischemico nella fase cronica di stabilizzazione.
- b. L'andatura elicopode è tipica della SM nella fase acuta
- c. L'andatura elicopode è tipica della Malattia di Parkinson nella fase cronica di stabilizzazione.
- d. L'andatura elicopode è tipica della Sclerosi Laterale Amiotrofica (S.L.A.) nella fase cronica di stabilizzazione.

14. Una embolia di frammenti di tessuto adiposo è una complicanza relativamente frequente di:

- a. Trombosi arteriosa
- b. Interventi chirurgici minori per l'asportazione di lipomi
- c. Fratture ossee diafisarie
- d. Trombosi venosa

15. Per quale delle seguenti malattie a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino?

- a. Epatite A
- b. Epatite B
- c. Toxoplasmosi
- d. Morbillo

16. Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura:

- a. Falciante
- b. Anserina
- c. Steppante
- d. Emiplegica

17. La visiera facciale, viene utilizzata nello svolgimento delle attività assistenziali, ed è definita:

- a. Dispositivo di Protezione Individuale rischio biologico
- b. Dispositivo di Protezione Individuale da infezioni causate da droplet
- c. Dispositivo di Protezione Individuale
- d. Dispositivo di Protezione Individuale da infezioni causate da droplet nuclei

18. La complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale è:

- a. Il vomito
- b. Il vomito associato a ipoglicemia
- c. L'infezione
- d. L'improvvisa ipoglicemia o iperglicemia

19. Al personale di supporto è possibile:

- a. Delegare attività o compiti semplici
- b. Attribuire compiti
- c. Delegare e valutare le attività svolte
- d. Attribuire compiti semplici e valutare tutte le attività svolte

20. Qual è il PH del sangue nell'individuo normale

- a. 4.5 – 5.5
- b. 7.35 – 7.40
- c. 7.5 – 7.6
- d. 6.5 – 6.8



