

1) Nel primo trimestre di gravidanza la produzione di progesterone è affidata a:

- [a] sincizio e corpo luteo
- [b] sincizio e corpo luteo gravidico
- [c] corpo luteo gravidico e placenta**
- [d] nessuna delle precedenti

2) Secondo il DM 740/94 (Art. 1), le competenze dell'ostetrica, trovano riscontri positivi presso gli ambulatori per le gravidanze a basso rischio a gestione ostetrica, perché la stessa:

- [a] conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità
- [b] tutte le precedenti**
- [c] assiste la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio
- [d] partecipa ai programmi di assistenza materna e neonatale

3) Quale articolo del codice penale prevede il reato di rivelazione di segreto professionale?

- [a] Art. 326 c.p.
- [b] Art. 348 c.p.
- [c] Art. 622 c.p.**
- [d] Art. 652 c.p.

4) Quale di questi parametri non è considerato nello score di Bishop?

- [a] Dilatazione della cervice
- [b] Presentazione fetale**
- [c] Posizione della cervice
- [d] Lunghezza della cervice

5) La patologia nota come “spina bifida” è conosciuta anche con il nome di:

[a] Meningomielocele

[b] Meningite

[c] Nessuna delle precedenti

[d] Meningocelite

6) Cosa si intende per “funneling”:

[a] La dilatazione dell’orifizio uterino esterno

[b] Il raccorciamento del collo dell’utero

[c] L’ammorbidimento del collo dell’utero durante i prodromi di travaglio

[d] La dilatazione dell’orifizio uterino interno

7) Nelle emorragie post partum quali metodi sono utili per quantificare la perdita ematica dal tratto genitale:

[a] stima visuale

[b] utilizzo di sacche trasparenti graduate per la raccolta di sangue

[c] peso di teli, garze e pezze intrise di sangue

[d] tutte le precedenti

8) La villocentesi:

[a] una tecnica di diagnosi prenatale finalizzata al prelievo di liquido amniotico, mediante puntura transaddominale, sotto il controllo ecografico

[b] una tecnica che consiste nella visualizzazione del feto tramite una sonda transaddominale

[c] Consiste nel prelievo di sangue fetale mediante puntura ecoguidata di uno dei vasi del funicolo ombelicale

[d] una tecnica utilizzata per il prelievo del trofoblasto mediante puntura transaddominale sotto controllo ecografico

9) Nelle due ore dopo il parto va assolutamente controllato:

[a] Tonicità addominale

[b] Il globo di sicurezza

[c] Eventuali punti di sutura

[d] Tutte le precedenti

10) Secondo i “dieci passi UNICEF- OMS per l’allattamento al seno” è necessaria la definizione di

[a] solo un’informazione verbale

[b] solo un’informazione al personale del Dipartimento Materno Infantile

[c] un protocollo scritto e condiviso

[d] Tutte le precedenti

11) Quali sono i reperi anatomici del diametro traverso dello stretto inferiore del bacino osseo?

[a] le due tuberosità ischiatiche

[b] le due spine degli ischi

[c] l’articolazione sacro iliaca e l’imminenza ileo-pettinea

[d] nessuna delle precedenti

12) Un’ostetrica, come realizza attività di prevenzione oncologica?

[a] attraverso interventi educativi sulla popolazione femminile nelle diverse fasce di età e condizioni sociali e sanitarie

[b] facendo, solo, una ricognizione della popolazione del proprio territorio sanitario

[c] attraverso la preparazione ed assistenza ad interventi chirurgici per patologie neoplastiche

[d] Nessuna delle precedenti

13) Il Q-tip test valuta:

- [a] Il tono muscolare
- [b] Il tono vescicale
- [c] Il riflesso addomino - perineale
- [d] L'ipermobilità uretrale

14) In caso di distocia di spalla quale manovra porta il diametro bisacromiale, posto in anteroposteriore, lungo il diametro obliquo?

- [a] manovra di Jacquemier
- [b] manovra di Rubin2
- [c] manovra di Zavanelli
- [d] nessuna delle precedenti

15) Durante la gravidanza la mammella subisce delle modificazioni. Nella zona dell'areola è possibile notare delle piccole rilevatezze chiamate:

- [a] tubercoli di Bertolino
- [b] tubercoli di Morgagni
- [c] tubercoli del Montgomery
- [d] nessuna delle precedenti

16) Dopo quale epoca di gravidanza è possibile, grazie ad un reperto ecografico, fare diagnosi di placenta previa?

- [a] Dopo la 30^a settimana
- [b] Dopo la 23^a settimana
- [c] Dopo la 25^a settimana
- [d] Nessuna delle precedenti

17) L'UNICEF raccomanda l'allattamento al seno esclusivo fino a :

- [a] 5 mesi

[b] 4 mesi

[c] 8 mesi

[d] 6 mesi

18) In presenza di un utero bicolle per lo screening cervice uterina è necessario attenersi a cosa?

[a] Eseguire due prelievi separatamente ed identificare su ognuno il lato

[b] non si apportano modifiche alla modalità convenzionale

[c] se ne attuano due solo su richiesta dell'utente

[d] Nessuna delle precedenti

19) Tra i rischi materno-fetali correlati all'amniocentesi troviamo:

[a] Rottura d'utero

[b] Perdite ematiche e/o distacco placentare

[c] Ipertensione gravidica

[d] Tutte le precedenti

20) Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione:

[a] la reattività

[b] il tono muscolare

[c] il colorito cutaneo

[d] il riflesso pupillare

21) La gonadotropina corionica raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche nella donna in gravidanza:

[a] tra la 8[^] e la 12[^] settimana

[b] Intorno alla 23[^] settimana

[c] tra la 20[^] e la 30[^] settimana

[d] Intorno alla 25[^] settimana

22) Il Maternity blues può durare generalmente:

[a] Fino al 5° giorno dopo il parto

[b] Fino al 7° giorno dopo il parto

[c] Fino al 3° giorno dopo il parto

[d] Nessuna delle precedenti

23) Il Progetto Obiettivo materno infantile (POMI) è parte integrante del Piano sanitario Nazionale del triennio:

[a] 1999/2001

[b] 1998/2000

[c] 1997/1999

[d] 1996/1998

24) Nella rotazione interna per le posizioni anteriori l'angolo di rotazione è di:

[a] 45°

[b] 3/8 di circonferenza

[c] 135°

[d] Nessuna delle precedenti

25) La più frequente complicazione della fecondazione in vitro è:

[a] Il tumore dell'ovaio

[b] La sindrome da iperstimolazione ovarica

[c] L'emorragia interna addominale

[d] L'endometriosi

26) Qual è l'obiettivo principale del Dlgs 81/08?:

[a] Garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale

- [b] Garantire il trattamento dei dati personali e tutelare la privacy
- [c] Regolamentare il corretto utilizzo dei DPI nei luoghi di lavoro
- [d] Nessuna delle precedenti

27) Quale ceppo è maggiormente responsabile del cervicocarcinoma?

- [a] 16
- [b] 18
- [c] 16 e 18
- [d] 11

28) Quali sono i fattori di rischio per le disfunzioni perineali?

- [a] Pregressa episiotomia
- [b] Gravidanza
- [c] Agonismo sportivo
- [d] Tutte le precedenti

29) La frequenza normale del battito cardiaco fetale è di:

- [a] > 160 battiti/min
- [b] 60/90 battiti/min
- [c] 90/120 battiti/min
- [d] Nessuna delle precedenti

30) L'esecuzione del tampone vagino-rettale eseguito in previsione del parto è finalizzato alla ricerca di:

- [a] trichomonas vaginalis
- [b] streptococco beta emolitico
- [c] miceti
- [d] tutte le precedenti

