

**1) Indicare l'affermazione non corretta riguardante il colostro:**

- [a] è più ricco in grassi del latte maturo
- [b] è più ricco in proteine del latte maturo
- [c] è più ricco in vitamina A rispetto al latte maturo
- [d] nessuna delle precedenti

**2) Il piano perineale è innervato dai nervi:**

- [a] Pelvici
- [b] Ipogastrici
- [c] Pudendi
- [d] Nessuna delle precedenti

**3) L'arteria uterina è un ramo dell'arteria:**

- [a] iliaca esterna
- [b] iliaca interna
- [c] femorale
- [d] renale

**4) A partire da quale mese la cute fetale si ricopre di vernice caseosa?**

- [a] V mese
- [b] VI mese
- [c] VII mese
- [d] Nessuna delle precedenti

**5) Una deviazione lombare della colonna vertebrale, che determina uno spostamento all'indietro della base del sacro, determina un bacino:**

- [a] imbutiforme
- [b] piatto
- [c] obliquo
- [d] nessuna delle precedenti

**6) I cateteri vescicali temporanei sono:**

- [a] Levin, Einhors, Faucher
- [b] Foley, Pezzer, Cuvelier
- [c] Nelaton, Tieman, Mercier
- [d] Nessuna delle precedenti

**7) Quale di queste presentazioni rappresenta un'indicazione assoluta al TC?**

[a] Fronte

[b] Faccia

[c] Podice

[d] Nessuna delle precedenti

**8) Il catetere di Ward viene utilizzato sovente per:**

[a] drenare ferite chirurgiche

[b] accesso di Bartolini

[c] cateterismo vescicale estemporaneo

[d] nessuna delle precedenti

**9) Cosa indica il termine VABRA?**

[a] Un esame biptico

[b] Un tipo di intervento chirurgico

[c] Tutte le precedenti

[d] Nessuna delle precedenti

**10) Nel praticare l'episiotomia mediolaterale, quali strutture anatomiche vengono incise?**

[a] I ventri muscolari del bulbo cavernoso, il trasverso superficiale e i fasci mediali della porzione pubococcigea dell'elevatore dell'ano

[b] Il centro fibroso del perineo, sul quale si inseriscono i muscoli bulbo cavernosi, trasversi superficiali e l'elevatore dell'ano

[c] Tutte le precedenti

[d] Nessuna delle precedenti

**11) In quale classe di Robson rientrano le donne con gravidanza multipla che vengono sottoposte a taglio cesareo?**

[a] III

[b] V

[c] II

[d] VIII

**12) Cosa si intende per intraoperative cell salvage (IOCS)?**

[a] E' una profilassi preventiva per le emorragie intraoperatorie

[b] Recupero di eritrociti intraoperatorio per restituirli al paziente

[c] Trasfusione di emazie intraoperatorie

[d] Nessuna delle precedenti

**13) Quale dei seguenti distretti, la velocimetria doppler prende in considerazione durante la gravidanza?**

- [a] Distretto utero-placentare e feto-placentare
- [b] Distretto fetale e utero-placentare
- [c] Distretto utero-placentare, feto-placentare e fetale
- [d] Nessuna delle precedenti

**14) I composti sulfamidici sono controindicati nel:**

- [a] I trimestre di gravidanza
- [b] II trimestre di gravidanza
- [c] III trimestre di gravidanza
- [d] nessuna delle precedenti

**15) Lo “Pterigiu colli” è un elemento caratteristico di quale delle seguenti malattie cromosomiche?**

- [a] Sindrome di Turner
- [b] Sindrome di Klinefelter
- [c] Sindrome di Patau
- [d] Nessuna delle precedenti

**16) La gonadotropina corionica raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche nella donna in gravidanza:**

- [a] intorno alla 25<sup>a</sup> settimana
- [b] tra la 8<sup>a</sup> e la 12<sup>a</sup> settimana
- [c] tra la 20<sup>a</sup> e la 30<sup>a</sup> settimana
- [d] nessuna delle precedenti

**17) Il segno di Donald, per la diagnosi in gravidanza, viene rilevato dall'operatore con:**

- [a] esplorazione bimanuale
- [b] esplorazione vaginale
- [c] manovre di Leopold
- [d] nessuna delle precedenti

**18) In base a quale articolo del codice penale è punito l'esercizio abusivo della professione?**

- [a] Art. 348 c.p.
- [b] Art. 222 c.p.
- [c] Art. 229 c.p.
- [d] Nessuna delle precedenti

**19) Quale fra le seguenti non è una posizione che permette l'apertura della parte superiore del bacino?**

- [a] In piedi
- [b] Dorso incurvato in avanti
- [c] Fianco
- [d] Carponi

**20) La statura media di un neonato è:**

- [a] 35 cm
- [b] 40 cm
- [c] 50 cm
- [d] Nessuna delle precedenti

**21) Quando viene usata la manovra di Brandt-Andrews?**

- [a] Espulsione della testa fetale
- [b] Disimpegno delle spalle
- [c] Secondamento
- [d] Nessuna delle precedenti

**22) Secondo la classificazione Bethesda Sistem 2001, le lesioni preinvasive vengono classificate in:**

- [a] LSIL
- [b] HSIL
- [c] Tutte le precedenti
- [d] Nessuna delle precedenti

**23) La manovra di Mauriceau-Meit-Smellie viene attuata:**

- [a] per il disimpegno delle braccia nel parto podalico
- [b] per il disimpegno della testa nel parto podalico
- [c] per il disimpegno delle spalle nel parto podalico
- [d] Nessuna delle precedenti

**24) Nella rotazione interna per le posizioni anteriori l'angolo di rotazione è di:**

- [a] 45°
- [b] 135°
- [c] 3/8 di circonferenza
- [d] Nessuna delle precedenti

**25) Quale dei seguenti parametri non prende in considerazione lo score di Bishop?**

- [a] posizione del collo uterino
- [b] dilatazione del collo uterino
- [c] parità
- [d] nessuna delle precedenti

**26) Secondo le linee guida RCOG “Gestione della gravidanza gemellare monocoriale” qual è l’epoca indicata per espletare il parto nelle gravidanze monocoricali monoamniotiche?**

- [a] 34+0 e 36+0 settimane di gestazione
- [b] 33+0 e 36+0 settimane di gestazione
- [c] 32+0 e 34+0 settimane di gestazione
- [d] 36+0 e 39+0 settimane di gestazione

**27) Nella placenta previa laterale, l’apice della stessa dista dall’orifizio uterino interno:**

- [a] almeno 1 cm
- [b] almeno 2 cm
- [c] almeno 3 cm
- [d] nessuna delle precedenti

**28) La sintomatologia caratteristica della placenta previa è:**

- [a] Ipertono e perdite di sangue vivo
- [b] Assenza di ipertono e perdite di sangue vivo
- [c] Perdita di sangue rosso scuro ed ipertono uterino
- [d] Nessuna delle precedenti

**29) In un distacco di placenta lieve, la porzione di placenta che si stacca dalla propria inserzione è generalmente:**

- [a] < di 1/6 della superficie placentare
- [b] < di ¼ della superficie placentare
- [c] di ¼ della superficie placentare
- [d] nessuna delle precedenti

**30) L’apoplessia utero-placentare è anche detta:**

- [a] Utero di Bendle
- [b] Utero di Couvelaire
- [c] Utero patologico di Malmström
- [d] Nessuna delle precedenti