

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI OSTETRICA .

23/09/2024

PROVA SCRITTA N. 2

1) L'amniocentesi si esegue :

- [a] tutte le precedenti
- [b] con la paziente in posizione laterale destra
- [c] sotto costante sorveglianza ecografica
- [d] senza guida ecografica

2) La via di somministrazione dell'atosiban è:

- [a] vaginale
- [b] intradermica
- [c] intramuscolare
- [d] endovenosa

3) Il rooming-in quale effetto non produce:

- [a] Favorisce il bonding mamma/bambino
- [b] Riduce l'interazione con il papà
- [c] Aumenta la durata dell'allattamento
- [d] Nessuna delle precedenti

4) I vasi del cordone ombelicale decorrono in un tessuto denominato:

- [a] gelatina di Wharton
- [b] nessuna delle precedenti
- [c] tessuto muscolare
- [d] tessuto fibroso

5) Nella presentazione di bregma qual è il diametro di impegno:

[a] occipito-frontale

[b] mento- occipitale

[c] bitrocanterico

[d] sottoccipito-bregmatico

6) I "fenomeni plastici" del parto sono fenomeni:

[a] fetali

[b] materno- fetali

[c] materni

[d] nessuna delle precedenti

7) Cosa si raccomanda di monitorare e documentare in cartella clinica nell'immediato post partum?

[a] parametri vitali

[b] tono uterino e perdite ematiche

[c] nessuna delle precedenti

[d] Tutte le precedenti

8) Cosa significa l'acronimo CID?

[a] Coagulopatia infettiva diffusa

[b] Coagulopatia intravasale disseminata

[c] Chronic intravascular disease

[d] Coagulopatia ischemica difforme

9) La manovra di “spremitura alla Credè” a cosa serve?

- [a] A evitare la rottura delle membrane
- [b] A indurre la rottura delle membrane
- [c] A promuovere l'espulsione della placenta
- [d] Nessuna delle precedenti

10) La preeclampsia può insorgere:

- [a] complicare un'ipertensione cronica
- [b] complicare un'ipertensione gestazionale
- [c] de novo
- [d] tutte le precedenti

11) Secondo la legge n. 194 del 22 Maggio 1978, l'obiezione di coscienza all'interruzione di gravidanza non può essere invocata dal personale sanitario:

- [a] Quando l'interruzione di gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal concepimento
- [b] Nelle strutture ospedaliere private
- [c] Quando l'intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo
- [d] Quando l'interruzione di gravidanza viene richiesta dopo i 90 gg dal concepimento

12) Quale tra le seguenti abitudini igienico comportamentali non è da raccomandare per la salute del pavimento pelvico?

- [a] Svuotare la vescica completamente
- [b] Spingere durante la minzione
- [c] Attivare il riflesso addomino-perineale quando c'è un aumento della pressione addominale
- [d] Tutte le precedenti

13) Con il termine puerperio si indica il range di tempo che va:

- [a] Dalla nascita a 4 settimane
- [b] Dalla nascita a 5 settimane
- [c] Dalla nascita a 6 settimane
- [d] Dalla nascita a 8 settimane

14) Quando viene prescritta la curva da carico in gravidanza ?

- [a] Fra 24[^] e 28[^] settimana se BMI > o uguale a 25 e la donna ha più di 36 anni
- [b] Fra la 16[^] e 18[^] settimana e dalla 24[^] alla 28[^] settimana se la donna presenta fattori di rischio per il diabete
- [c] Fra 24[^] e 30[^] settimana se pregressa macrosomia fetale
- [d] Fra 24[^] e 30[^] settimana se la donna proviene dal Medio Oriente

15) Il detrusore è:

- [a] Un muscolo del perineo
- [b] Il muscolo della vescica
- [c] Un legamento dell'utero
- [d] Nessuna delle precedenti

16) La causa principale di dispareunia profonda è:

[a] Endometriosi

[b] Ascesso tubo-ovarico

[c] Infertilità

[d] Prolasso vescicale

17) Quale dei seguenti farmaci è indicato per l'inibizione dell'allattamento?

[a] Cabergolina

[b] Amoxicillina

[c] Tetraciclina

[d] Nessuna delle precedenti

18) La seconda manovra di Leopold serve a:

[a] Valutare il grado di discesa della parte presentata

[b] Determinare la situazione del feto

[c] Determinare il livello del fondo uterino

[d] Nessuna delle precedenti

19) Quali sono le controindicazioni al rivolgimento per manovre esterne?

- [a] Placenta previa, sanguinamento vaginale, cicatrici e malformazioni uterine
- [b] Travaglio di parto, rottura delle membrane e anomalie cardiocografiche
- [c] Gravidanza multipla
- [d] Tutte le precedenti

20) Il campo di esercizio professionale proprio dell'Ostetrica/o è regolamentato da:

- [a] Codice Deontologico dell'ostetrica
- [b] D.M. 740 del 14 settembre 1994
- [c] Piano di studi dei percorsi formativi di base e post base
- [d] Tutte le precedenti

21) L'immunoprofilassi anti-D post amniocentesi:

- [a] Deve essere eseguita a tutte le pazienti
- [b] Non deve essere eseguita per le possibilità basse di isoimmunizzazione
- [c] Deve essere eseguita alle pazienti RH negative
- [d] Nessuna delle precedenti

22) L'acronimo IBCLC è utilizzato per definire:

- [a] Un Consulente sanitario per lo screening
- [b] Un professionista specializzato nella gestione clinica dell'allattamento al seno
- [c] Un professionista specializzato nella gestione della gravidanza fisiologica
- [d] Nessuna delle precedenti

23) Quali tra quelle indicate non è una manovra di trattamento della distocia di spalla?

[a] Manovra di Rubin

[b] Manovra di Jacquemier

[c] Manovra di Mc Roberts

[d] Manovra di Mauriceau-Meit-Smellie

24) Che cos'è il piano perineale?

[a] E' la parte inferiore del muscolo diaframmatico

[b] E' un tessuto unico che sorregge la vescica

[c] È l'insieme di tessuti molli, muscoli e fibre che chiude il bacino nel suo distretto inferiore

[d] nessuna delle precedenti

25) Quali tra i seguenti è un sintomo tipico dell'endometriosi?

[a] Disuria

[b] Irregolarità del ciclo mestruale

[c] Perdite di sangue rosso vivo

[d] Il dolore

26) Il cordone ombelicale contiene:

[a] 2 vene e 1 arteria

[b] 2 arterie e 2 vene

[c] 2 arterie e 1 vena

[d] 1 arteria e 1 vena

27) Il fattore di rischio principale per il tumore squamoso della cervice uterina è rappresentato da:

[a] Assunzione di estroprogestinici

[b] Infezione da papilloma virus humano (HPV)

[c] Menopausa tardiva

[d] Fumo di sigaretta e obesità

28) La sintomatologia della placenta previa è rappresentata principalmente da:

[a] perdita di liquido amniotico

[b] metrorragia

[c] presenza di contrazioni

[d] nessuna delle precedenti

29) Quale tra queste patologie neonatali non è associata ad infezione da rubeovirus in gravidanza?

[a] Sordità

[b] Focomelia

[c] Cecità

[d] Nessuna delle precedenti

30) Tra gli obiettivi del terzo trimestre di gravidanza a gestione ostetrica in un ambulatorio a guida ostetrica, rientra:

[a] Accertare, confermare, sostenere lo stato fisiologico della gravidanza

[b] Favorire e condividere la scelta delle modalità e del luogo del parto, in considerazione delle condizioni materno fetali

[c] Favorire la continuità assistenziale territorio/ospedale

[d] tutte le precedenti