

1. Per bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico, a supporto della comunicazione sociale NON è consigliabile:
  - a) fornire suggerimenti visivi
  - b) aumentare le richieste di interazione sociale
  - c) seguire una routine
  - d) minimizzare le stimolazioni sensoriali
  
2. La definizione di passaggio di parte del bolo nel vestibolo laringeo:
  - a) penetrazione
  - b) aspirazione
  - c) ristagno
  - d) polmonite ab ingestis
  
3. Persistente difficoltà nella produzione di suoni linguistici che interferisce con l'intelligibilità dell'eloquio o impedisce la comunicazione verbale è:
  - a) Disturbo del linguaggio
  - b) Disturbo fonetico-fonologico
  - c) Disturbo della fluenza con esordio nell'infanzia (balbuzie)
  - d) Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica)
  
4. In quale fase ha inizio la deglutizione riflessa:
  - a) Fase 1 buccale
  - b) Fase 2 orale
  - c) Fase 3 faringea
  - d) Fase 4 esofagea
  
5. Test che può essere somministrato a una persona adulta bilingue:
  - a) ALCE
  - b) BAT
  - c) IDA
  - d) BABIL
  
6. NON è una causa all'origine dell'afasia:
  - a) ictus cerebrale
  - b) trauma cranio-encefalico
  - c) sclerosi multipla
  - d) neoplasia cerebrale
  
7. Il disturbo della comprensione del testo è da escludere:
  - a) nel caso in cui la prestazione nella prova di comprensione da ascolto sia adeguata
  - b) in presenza di punteggi al di sotto di quanto atteso per età nel ragionamento non verbale
  - c) tutte le risposte precedenti
  - d) nessuna delle risposte precedenti
  
8. In un paziente afasico la presenza di depressione del tono dell'umore:
  - a) non ha impatto sull'attività riabilitativa
  - b) può avere impatto negativo sull'attività riabilitativa
  - c) può avere impatto sull'attività riabilitativa in relazione all'età del paziente
  - d) può avere impatto sull'attività riabilitativa in relazione alla sede della lesione

9. Quali dei seguenti aspetti NON è un sintomo percettivo di disfonia:

- a) voce pressata
- b) voce tesa
- c) voce eufonica
- d) voce soffiata

10. Nel test BDE-2 è una prova facoltativa:

- a) lettura di numeri
- b) moltiplicazioni a mente
- c) operazioni scritte
- d) triplette

11. La CAA:

- a) incrementa le possibilità comunicative ed esclude alcuni canali comunicativi
- b) incrementa le possibilità comunicative ed esclude modalità di comunicazione alternative
- c) limita le possibilità comunicative e include modalità di comunicazione alternative
- d) incrementa le possibilità comunicative e include modalità di comunicazione alternative

12. Quale forma di disartria è legata a lesioni cerebellari:

- a) spastica
- b) atassica
- c) ipocinetica
- d) flaccida

13. Il trattamento dei bambini che iniziano a balbettare prima dell'età dei 4 anni inizia:

- a) prima dei 5 anni
- b) dopo i 5 anni
- c) prima dei 6 anni
- d) dopo i 6 anni

14. In relazione all'evoluzione della balbuzie se il bambino manifesta 10 o meno disfluenze per 100 parole, ripetizioni di una unità, per lo più ripetizioni, interiezioni e revisioni, non è consapevole e non c'è preoccupazione presenta:

- a) disfluenza normale
- b) balbuzie borderline
- c) balbuzie in fase iniziale
- d) balbuzie in fase intermedia

15. In base al DM 14/09/1994, n. 742 il logopedista elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile:

- a) solo per i pazienti di età adulta
- b) solo per i pazienti di età evolutiva
- c) sempre
- d) solo quando richiesto dai caregiver

16. Test che valuta i precursori per la comunicazione aumentativa:

- a) COMFOR
- b) CCC-2
- c) APL-MEDEA
- d) QS4-G

17. L'Ordine TSRM-PSTRP è stato istituito attraverso:
- legge 11 gennaio 2010, n. 3
  - legge 11 gennaio 2018, n. 3
  - legge 11 gennaio 1999, n. 3
  - legge 11 gennaio 2021, n. 3
18. L'ABA è un programma comportamentale che prevede:
- intervento precoce e intensivo mediato dai genitori senza supporto di professionisti specializzati
  - intervento precoce e intensivo effettuato esclusivamente da professionisti specializzati
  - intervento intensivo mediato dai genitori con il supporto di professionisti specializzati
  - intervento precoce e intensivo mediato dai genitori con il supporto di professionisti specializzati
19. Secondo il Codice Deontologico l'esercizio della professione si attua anche mediante i seguenti interventi logopedici:
- analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita
  - revisione del programma di intervento
  - tutte le precedenti
  - nessuna delle precedenti
20. Nel morbo di Parkinson sono indicati i trattamenti:
- LSVT/LMRVT
  - PLVT/LSVT
  - PROEL/LMRVT
  - LMRVT/PLVT
21. Nelle disfagie oro-faringee sono alterate le seguenti fasi della deglutizione:
- fasi 2, 3 o 4
  - fasi 2, 3, 4 e 5
  - fasi 1, 2 o 3
  - fasi 4 e 5
22. La legge che persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni:
- legge 104/1992
  - legge 170/2010
  - legge 234/2021
  - legge 134/2015
23. Il GDSAp, previsto dalla DGR 4 febbraio 2014 n. 16-7072, è composto da:
- neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, educatore
  - neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, tutor DSA
  - neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, TNPEE
  - neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, pedagista
24. Un bambino che presenta un ritardo nello sviluppo socio-comunicativo che può essere dedotto da assenza o ridotto contatto oculare, assenza dell'indicazione per chiedere o condividere, ridotta o assente risposta al nome, scarsa reciprocità sociale si considera a rischio di:
- disturbo specifico dell'apprendimento
  - disturbo dello spettro dell'autismo
  - ADHD
  - disturbo primario del linguaggio

25. Un problema nella conduzione delle onde sonore attraverso il condotto uditivo esterno, la membrana timpanica o l'orecchio medio causa:

- a) ipoacusia trasmissiva
- b) ipoacusia neurosensoriale
- c) ipoacusia mista
- d) presbiacusia

26. Nella CAA i VOCAs sono:

- a) ausili a bassa tecnologia
- b) ausili ad alta tecnologia
- c) a)+b)
- d) non sono ausili usati in CAA

27. Test che possono essere somministrati a bambini di età inferiore a 3 anni:

- a) COVER, PCGO, TCGB
- b) PING, COVER, PCGO
- c) PING, PCGO, TNL
- d) PING, COVER, TROG-2

28. Tra le norme di igiene vocale è sconsigliata:

- a) umidificazione
- b) idratazione
- c) voce sussurrata
- d) ventilazione nasale

29. Strategia che consiste nella riformulazione della produzione linguistica del bambino da parte dell'adulto:

- a) modeling
- b) recast
- c) cueing
- d) retelling

30. Tra gli interventi mediati dai genitori sono efficaci:

- a) quelli basati sulla lettura condivisa
- b) quelli che insegnano ai genitori strategie di facilitazione del linguaggio durante il gioco e le attività quotidiane
- c) a)+b)
- d) nessuno dei precedenti