

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI INFERMIERE.

07/05/2024

PROVA PRATICA N. 1

ESAMEN

PROVA

PROVA PRATICA N. 1

- 1) **Devo somministrare 600 mg di ampicillina: sono a disposizione fiale di ampicillina 1 gr da diluire con 3 ml. Quanti ml devo utilizzare:**
- a. 1,8 ml
 - b. 1,5 ml
 - c. 1,0 ml
 - d. 5 ml
- 2) **Quale precauzione generale deve essere adottata prima di mobilizzare un paziente che ha subito un intervento chirurgico:**
- a. applicare le fasce elastiche degli arti inferiori
 - b. adottare misure atte a prevenire il reflusso del liquido drenato
 - c. attendere che abbia terminato la terapia infusioneale
 - d. attendere il fisioterapista
- 3) **Per praticare correttamente un tampone faringeo occorre:**
- a. non è opportuno effettuarlo al mattino
 - b. il paziente deve essere digiuno senza aver effettuato igiene orale
 - c. il paziente deve essere istruito a effettuare una corretta igiene orale
 - d. il paziente deve essere digiuno e deve aver effettuato igiene orale
- 4) **La raccomandazione CORRETTA sulla medicazione della ferita chirurgica è:**
- a. va sostituita, prima delle 24-48 ore successive all'intervento chirurgico, solo se visibilmente sporca di sangue, siero o bagnata.
 - b. va sostituita ogni giorno dopo la dimissione al domicilio.
 - c. va sostituita solo in seguito alla rimozione del drenaggio.
 - d. va sostituita solo in seguito alla rimozione dei punti di sutura.
- 5) **Durante le attività di movimentazione dei pazienti è importante:**
- a. avere il massimo equilibrio del corpo
 - b. non piegarsi sulle ginocchia
 - c. prendere il paziente per gli arti superiori o inferiori
 - d. flettere il busto in avanti per avvicinarsi quanto più possibile
- 6) **Uno dei seguenti strumenti NON deve essere preparato per l'intubazione endotracheale:**
- a. mandrino
 - b. tubo tracheale a bassa pressione
 - c. pinza ad anelli
 - d. laringoscopio

7) Quali delle seguenti valutazioni ha la priorità nel paziente politraumatizzato:

- a. controllo dello stato di coscienza
- b. controllo della respirazione
- c. controllo della pervietà delle vie aeree
- d. controllo dell'attività cardiocircolatoria

8) La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante:

- a. dall'interno verso l'esterno in modo circolare
- b. dall'esterno verso l'interno a raggiera
- c. dall'esterno verso l'interno in modo circolare
- d. dall'interno verso l'esterno a raggiera

9) Per un neonato la sede elettiva per l'iniezione intramuscolare è:

- a. ventro-glutea
- b. deltoide
- c. retto femorale
- d. dorso-glutea

10) Quali dei seguenti interventi può essere sempre attuato per favorire la comunicazione con un paziente affetto da emiplegia destra e afasia:

- a. formulare domande in modo che la risposta possa essere fornita in termini di "sì" e "no"
- b. servirsi della mediazione di un parente per decodificare il messaggio
- c. mettere a disposizione del paziente il necessario per scrivere
- d. nessuna delle precedenti

11) Il catetere di Swan-Ganz si usa per:

- a. drenaggio toracico
- b. somministrazione di nutrizione parenterale totale
- c. misurare la pressione a livello dell'arteria polmonare
- d. ridurre il vomito alimentare

12) Nel quadro dello shock settico manca:

- a. brivido che precede l'ipotensione
- b. bradicardia
- c. ipotensione
- d. cute calda e asciutta

13) Il ferro somministrato per via orale può causare:

- a. policitemia
- b. aumento delle transaminasi
- c. prurito
- d. disturbi gastrointestinali

14) Il metodo attualmente più diffuso per la rilevazione del rischio nelle strutture sanitarie è:

- a. il metodo NIOSH
- b. il metodo MAPO
- c. la valutazione del numero di posti letto
- d. la misura dinamometrica

15) La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è detta:

- a. per seconda intenzione
- b. per prima intenzione
- c. granulazione
- d. accostamento

16) Devi praticare un'iniezione intramuscolare e la sede ventro glutea dell'assistito non è accessibile. Quale fra le seguenti sedi alternative puoi utilizzare:

- a. sede poplitea
- b. sede vasto laterale
- c. sede calcaneare
- d. sede toracica

17) L'indagine gold standard per evidenziare un'esofagite da reflusso è:

- a. esame radiologico
- b. esame endoscopico
- c. esame scintigrafico
- d. esame clinico

18) Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:

- a. la cintura ergonomica
- b. lo stabilizzatore per la postura corretta
- c. il telo ad alto scorrimento
- d. il telo porta feriti

19) Se durante una trasfusione di emazie il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore è necessario:

- a. diminuire la velocità di trasfusione e informare il medico
- b. sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare immediatamente il medico
- c. diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10 - 15 minuti
- d. nessuna delle precedenti

20) La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:

- a. di urine e di sangue prelevato la mattina
- b. di sangue, più uno di urine delle 24 ore
- c. solo di sangue
- d. solo di urine delle 24 ore

21) Descriva sinteticamente ciò che non deve mancare in un carrello di emergenza.



22) Descrivi questa immagine sinteticamente.



23) Illustri sinteticamente a cosa servono questi 2 macchinari.



24) Descriva sinteticamente l'utilizzo di questo presidio.



