



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - PROFILO DI OSTETRICA .

23/09/2024

PROVA PRATICA N. 1

PAOLA SCARZELLO

PROVA ESTRATTA

Paola Scarzello

1) La quarta manovra di Leopold:

- [a] Consente di determinare la situazione del feto
- [b] Permette una stima approssimativa dell'accrescimento fetale
- [c] Entrambe le precedenti
- [d] Nessuna delle precedenti

2) Cos'è il partogramma?

- [a] E' lo strumento di registrazione grafica utilizzato dall'ostetrica per la sorveglianza del travaglio di parto
- [b] E' lo strumento di competenza medica per la sorveglianza del travaglio di parto
- [c] E' lo strumento di registrazione grafica utilizzato dall'anestesista per la sorveglianza del travaglio di parto con analgesia
- [d] Nessuna delle precedenti

3) Quali tra le seguenti condizioni non è correlata al distacco intempestivo di placenta:

- [a] ipertono uterino
- [b] bradicardia fetale
- [c] perdite ematiche dai genitali esterni
- [d] ipotono uterino

4) Quali tra i seguenti fanno parte dei segni "di presunzione" della gravidanza:

- [a] Amenorrea

8) Quali parametri vengono valutati in un tracciato cardiografico?

- [a] Linea di base, variabilità, accelerazioni, decelerazioni
- [b] Linea di base, variabilità
- [c] Presenza dei movimenti fetali, variabilità, accelerazioni
- [d] Nessuna delle precedenti

9) Secondo la L.194/78 il medico del consultorio, della struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, non riscontrando il caso di urgenza, rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta e la invita a soprassedere:

- [a] Per 3 giorni
- [b] Per 6 giorni
- [c] Per 4 giorni
- [d] Per 7 giorni

10) Nella presentazione di fronte qual è l'indice fetale?

- [a] Mento
- [b] Fronte

14) Nelle donne con fenotipo Rh (D) negative non sensibilizzate, a quale settimana di gestazione è consigliato eseguire l'immunoprofilassi anti-D?


- [a] Entro il I trimestre
- [b] A 16 settimane
- [c] A 28 settimane
- [d] S 32 settimane

15) Quale è il periodo più suscettibile agli agenti teratogeni?

- [a] Il momento immediatamente successivo al parto
- [b] Il periodo embrionale
- [c] Il periodo che va dai 2 ai 6 mesi del neonato
- [d] Nessuna delle precedenti

16) Nelle 48-72 ore precedenti un pap-test sarebbe meglio evitare:

- [a] L'inserimento di ovuli vaginali
- [b] Lavande vaginali
- [c] Rapporti sessuali
- [d] Tutte le precedenti



2. Quale tipo di manovra sta effettuando l'operatrice e a cosa serve?



4. Quale tipo di presentazione fetale è rappresentata?
