



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A  
TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI  
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI OSTETRICA .

23/09/2024

**PROVA SCRITTA N. 1**

PAOLA SCARZELLO PROVA ESTRATTA  
Paola Scarzello

**1) Nel primo trimestre di gravidanza la produzione di progesterone è affidata a:**

- [a] sincizio e corpo luteo
- [b] sincizio e corpo luteo gravidico
- [c] corpo luteo gravidico e placenta
- [d] nessuna delle precedenti

**2) Secondo il DM 740/94 (Art. 1), le competenze dell'ostetrica, trovano riscontri positivi presso gli ambulatori per le gravidanze a basso rischio a gestione ostetrica, perché la stessa:**

- [a] conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità
- [b] tutte le precedenti
- [c] assiste la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio
- [d] partecipa ai programmi di assistenza materna e neonatale

**3) Quale articolo del codice penale prevede il reato di rivelazione di segreto professionale?**

- [a] Art. 326 c.p.
- [b] Art. 348 c.p.
- [c] Art. 622 c.p.
- [d] Art. 652 c.p.

**4) Quale di questi parametri non è considerato nello score di Bishop?**

- [a] Dilatazione della cervice
- [b] Presentazione fetale
- [c] Posizione della cervice
- [d] Lunghezza della cervice

**9) Nelle due ore dopo il parto va assolutamente controllato:**

- [a] Tonicità addominale
- [b] Il globo di sicurezza
- [c] Eventuali punti di sutura
- [d] Tutte le precedenti

**10) Secondo i “dieci passi UNICEF- OMS per l’allattamento al seno” è necessaria la definizione di**

- [a] solo un’informazione verbale
- [b] solo un’informazione al personale del Dipartimento Materno Infantile
- [c] un protocollo scritto e condiviso
- [d] Tutte le precedenti

**11) Quali sono i reperi anatomici del diametro trasverso dello stretto inferiore del bacino osseo?**

- [a] le due tuberosità ischiatiche
- [b] le due spine degli ischi
- [c] l’articolazione sacro iliaca e l’imminenza ileo-pettinea
- [d] nessuna delle precedenti

**12) Un’ostetrica, come realizza attività di prevenzione oncologica?**

- [a] attraverso interventi educativi sulla popolazione femminile nelle diverse fasce di età e condizioni sociali e sanitarie
- [b] facendo, solo, una ricognizione della popolazione del proprio territorio sanitario
- [c] attraverso la preparazione ed assistenza ad interventi chirurgici per patologie neoplastiche
- [d] Nessuna delle precedenti

- [b] 4 mesi
- [c] 8 mesi
- [d] 6 mesi

**18) In presenza di un utero bicolle per lo screening cervice uterina è necessario attenersi a cosa?**

- [a] Eseguire due prelievi separatamente ed identificare su ognuno il lato
- [b] non si apportano modifiche alla modalità convenzionale
- [c] se ne attuano due solo su richiesta dell'utente
- [d] Nessuna delle precedenti

**19) Tra i rischi materno-fetali correlati all'amniocentesi troviamo:**

- [a] Rottura d'utero
- [b] Perdite ematiche e/o distacco placentare
- [c] Ipertensione gravidica
- [d] Tutte le precedenti

**20) Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione:**

- [a] la reattività
- [b] il tono muscolare
- [c] il colorito cutaneo
- [d] il riflesso pupillare

**21) La gonadotropina corionica raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche nella donna in gravidanza:**

- [a] tra la 8<sup>^</sup> e la 12<sup>^</sup> settimana
- [b] Intorno alla 23<sup>^</sup> settimana
- [c] tra la 20<sup>^</sup> e la 30<sup>^</sup> settimana
- [d] Intorno alla 25<sup>^</sup> settimana

- [b] Garantire il trattamento dei dati personali e tutelare la privacy
- [c] Regolamentare il corretto utilizzo dei DPI nei luoghi di lavoro
- [d] Nessuna delle precedenti

**27) Quale ceppo è maggiormente responsabile del cervicocarcinoma?**

- [a] 16
- [b] 18
- [c] 16 e 18
- [d] 11

**28) Quali sono i fattori di rischio per le disfunzioni perineali?**

- [a] Pregressa episiotomia
- [b] Gravidanza
- [c] Agonismo sportivo
- [d] Tutte le precedenti

**29) La frequenza normale del battito cardiaco fetale è di:**

- [a] > 160 battiti/min
- [b] 60/90 battiti/min
- [c] 90/120 battiti/min
- [d] Nessuna delle precedenti

**30) L'esecuzione del tampone vagino-rettale eseguito in previsione del parto è finalizzato alla ricerca di:**

- [a] trichomonas vaginalis
- [b] streptococco beta emolitico
- [c] miceti
- [d] tutte le precedenti