

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE VC



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 UNITÀ NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI INFERNIERE.

07/05/2024

PROVA SCRITTA N. 3

Prova scritta

[Handwritten signature]

PROVA SCRITTA N. 3

1) Il concetto di self care è stato elaborato da:

- a. N. Roper
- b. B D. Orem
- c. M. Montessori
- d. nessuna delle precedenti

2) La mononucleosi è una malattia:

- a. infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A
- b. infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus
- c. infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus
- d. nessuna delle precedenti

3) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito può determinare:

- a. alcalosi metabolica
- b. acidosi metabolica
- c. iponatriemia
- d. ipoglicemia

4) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:

- a. secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- b. secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- c. secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
- d. secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e disuria

5) Considerando l'interazione possibile fra proteine e farmaci, per quale tra le seguenti classi di farmaci è indicata la somministrazione lontano dai pasti:

- a. calcioantagonisti
- b. antiparkinsoniani
- c. cortisonici
- d. antibiotici

6) La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:

- a. eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani
- b. eliminare lo sporco visibile e rimuovere la flora batterica transitoria delle mani
- c. eliminare la flora batterica transitoria e ridurre in modo consistente la flora batterica residente delle mani e degli avambracci
- d. eliminare la flora batterica

7) Per effettuare un prelievo di sangue da un catetere venoso centrale:

- a. occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata
- b. è indispensabile utilizzare ul sistema sottovuoto (Vacutainer)
- c. occorre eliminare i primi 5-10 ml di sangue prelevato
- d. non è possibile effettuare un prelievo di sangue da un catetere venoso centrale

- a. il timo
- b. la miseria
- c. il fegato
- d. il pancreas

15) L'organo che subisce un processo di regressione fisiologica dopo la pubertà è:

- a. solo se il dolore è insopportabile
- b. prima delle ore notturne
- c. quando compare il dolore
- d. prima che compaia il dolore

14) Tra i criteri generali per la terapia del dolore, risulta importante somministrare i farmaci:

- a. una emorragia intramamolare
- b. anomalie congenita
- c. una fibrosi cutanea cutanea
- d. una linfangiite carcinomatosa del derrame

13) La pelle a "buccia di arancia" della mammella è dovuta a:

- a. respirazione, comunicazione, messaggio
- b. respirazione, eliminazione, video
- c. autostima, sicurezza, tutela della privacy
- d. respirazione, sicurezza, tutela della privacy

12) I bisogni prioritari di un paziente durante la crisi convulsiva sono:

- a. ipoglicemia
- b. osteoporosi
- c. limitazione della crescita
- d. ritenzione salina

11) Nei corticosteroidi NON è considerato come effetto collaterale:

- a. sangue proveniente dal ventricolo sinistro quindi ben ossigenato
- b. è sangue arterioso e perciò ben ossigenato
- c. è sangue venoso e perciò scarsamente ossigenato
- d. nessuna delle precedenti

10) Il sangue contenuto nelle arterie polmonari:

- a. quando c'è imapprenenza
- b. quando il paziente non è in grado di inghiottire i cibi e quando il tatto gastrometrico superiore è danneggiato
- c. in caso di obesità
- d. dopo interventi chirurgici

9) La nutrizione entrale viene utilizzata:

- a. insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
- b. alteranza quotidiana di periodi febbiliti ad aprecessia
- c. presenza di oscillazioni senza che la temperatura retinica nei valori normali
- d. alteranza notturna di periodi febbiliti ad aprecessia

8) La curva febbile continua è caratterizzata da:

16) Per la valutazione del dolore in un bambino con età superiore ai 3 anni si usa normalmente:

- a. Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability (FLACC)
- b. Scala Numerico-Verbale
- c. Scala di Wong-Baker
- d. Premature Infant Pain Profile (PIPP)

17) Il farmaco che solitamente viene utilizzato per il trattamento delle reazioni anafilattiche gravi è:

- a. l'atropina
- b. l'adrenalina
- c. la difenidramina
- d. il metilprednisolone

18) La manovra di Heimlich si esegue per:

- a. rimuovere corpi estranei dalle prime vie aeree
- b. valutare la presenza di patologie acute a carico del peritoneo
- c. ridurre la lussazione scapolo-omerale
- d. valutare la presenza di patologie acute a carico dell'apparato respiratorio

19) La differenza tra una pomata e una crema è:

- a. la diversa percentuale di principio attivo
- b. il tempo di applicazione
- c. la diversa percentuale di acqua
- d. la modalità d'uso

20) La lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico si caratterizza per:

- a. bordo dell'ulcera iperkeratosico
- b. ubicazione prevalentemente unilaterale
- c. scarsa tendenza alla riparazione se adeguatamente scarificata
- d. localizzazione dorsale o peri-malleolare

21) Nella sequenza delle procedure di BLS, la lettera "C" corrisponde alla valutazione della:

- a. necessità di cardioversione
- b. necessità di defibrillazione
- c. circolazione
- d. assetto coagulativo

22) Uno tra questi antisettici NON è raccomandato per l'inserimento di un catetere venoso periferico:

- a. Acqua ossigenata al 3%
- b. Clorexidina al 2%
- c. Iodiopovidone al 10%
- d. Alcol al 70%

- a. Posizione seduta
- b. Posizione di Trendelenburg
- c. Posizione laterale
- d. Posizione di Fowler

29) Per eseguire l'igiene del cavo orale in un paziente inconsciente, è opportuno fargli assumere la:

- a. valuta il rischio anestesiologico in base alle condizioni del paziente
- b. valuta il grado delle lesioni da decubito nel paziente alleato
- c. valuta la gravità delle ulcere nel paziente con piede diabetico
- d. valuta il grado di coscienza e la risposta motora in un paziente sottoposto ad anestesia generale

28) Quale delle seguenti affermazioni sulla scala ASA è corretta:

- a. Dorothea Orem
- b. Florence Nightingale
- c. Virginia Henderson
- d. Martha Rogers

27) Il termine "salute positiva" è stato usato per la prima volta da:

- a. consiste in un'aspirazione prima di un'iniezione intramuscolare tra i 5 e i 10 secondi
- b. è sempre necessaria prima di un'iniezione intramuscolare sottocutanea
- c. è sempre necessaria prima di un'iniezione intramuscolare con tecnica a Z
- d. è sempre necessaria prima di un'iniezione intramuscolare con tecnica a Z

26) La manovra di Lesser:

- a. L'emocoltura
- b. il prelievo arterioso da site radiale
- c. l'iniezione intramuscolare con tecnica a Z
- d. la parte della manovra di Lesser

25) Il test di Allen rigetta quelle azioni di quale procedura:

- a. uso di enzimi proteolitici, tecnica chirurgica, tecnica biologica, tecnica autolitica
- b. tecnica chirurgica, uso di enzimi proteolitici, tecnica autolitica
- c. tecnica autolitica, tecnica biologica, tecnica chirurgica, determinazione
- d. tecnica autolitica, tecnica chirurgica, medicazione e detersione

24) I metodi di debridement di una ferita comprendono:

- a. la motilità, i riflessi pupillari e la respirazione
- b. la respirazione, la frequenza cardiaca e i riflessi tendini
- c. la risposta motora, l'apertura degli occhi e la risposta verbale
- d. il tono muscolare, la motilità oculare e la pressione arteriosa

23) La Glasgow Coma Scale valuta:

30) L'iperestensione del capo ha lo scopo di:

- a. aprire le vie aeree
- b. mettere in asse le vertebre cervicali
- c. eliminare corpi estranei dalle vie aeree
- d. assicurare una posizione adeguata del capo

