



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI INFERMIERE.

07/05/2024

PROVA SCRITTA N. 1

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PROVA SCRITTA N. 1

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke and a large loop.

1) L'allettamento predispone alla formazione di ulcere da pressione prevalentemente nelle seguenti zone:

- a. mento, guancia, spalla, dorso delle mani, ginocchio
- b. occipite, scapola, spalla, processo spinoso, gomiti, talloni, sacro
- c. occipite, padiglione auricolare, scapola, spalla, processo spinoso, malleoli laterali
- d. occipite, spalla, scapola, gomiti, ischio, sacro, ginocchia

2) Le dita a bacchette di tamburo possono ritrovarsi in caso di:

- a. broncopneumopatie ostruttive
- b. cirrosi epatica
- c. sclerodermia
- d. ipertiroidismo

3) Il trattamento di una lesione di II stadio molto essudante prevede:

- a. la detersione della lesione con soluzione fisiologica ed utilizzo di schiume di poliuretano o idro-fibra
- b. la detersione della lesione con Ringer lattato ed utilizzo di idrogel
- c. la detersione con sapone a pH neutro e l'utilizzo di schiuma in poliuretano
- d. la detersione della lesione con soluzione fisiologica ed utilizzo di un film in poliuretano

4) Quali sono i siti per la rilevazione del polso periferico:

- a. temporale, carotideo, brachiale, radiale, ulnare, tibiale posteriore
- b. retro-auricolare, carotideo, ascellare, femorale, tibiale anteriore, dorsale del piede
- c. carotideo, brachiale, radiale, ulnare, femorale, tibiale anteriore, dorsale del piede
- d. temporale, carotideo, brachiale, radiale, ulnare, tibiale posteriore, dorsale del piede

5) Quali sono i sintomi dell'ipossia:

- a. agitazione, tachipnea, bradicardia, ipotensione
- b. agitazione, tachipnea, tachicardia, coma, confusione
- c. agitazione, tachipnea, tachicardia, confusione
- d. agitazione, confusione, palpitazione, sudorazione

6) Qual è secondo il profilo dell'operatore sociosanitario (O.S.S.) in ambiente ospedaliero la risposta corretta:

- a. l'OSS opera in cooperazione diretta con l'infermiere per attività assistenziali complesse
- b. l'OSS opera in cooperazione indiretta con l'infermiere per attività assistenziali complesse
- c. l'OSS opera in autonomia, quando è autorizzato, anche per attività assistenziali complesse
- d. l'OSS opera in cooperazione diretta con l'infermiere per attività assistenziali semplici

7) Quale dieta deve seguire un paziente affetto da patologia infiammatoria cronica dell'intestino in fase di riacutizzazione:

- a. iperlipidica, iperproteica, iper-idratante, ipervitaminica, ricca di scorie
- b. ipolipidica, iperproteica, ricca di scorie
- c. ipoproteica, iperlipidica, iperidratante, ipercalorica
- d. iperproteica, ipolipidica, ipervitaminica, iperidratante, ipercalorica

8) Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di:

- a. colecistite
- b. pancreatite acuta
- c. occlusione intestinale
- d. litiasi renale

9) La scala di Braden:

- a. è uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati
- b. è uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell'anziano
- c. è uno strumento per la valutazione del rischio di cadute
- d. è uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione

10) Gli anticorpi sono prodotti da:

- a. linfociti T helper
- b. linfociti citotossici
- c. macrofagi
- d. plasmacellule

11) Le linee guida derivano da:

- a. osservazioni della pratica clinica quotidiana
- b. consensus conference e audit clinici
- c. un processo di revisione sistematica della letteratura e dell'opinione degli esperti
- d. analisi di dati provenienti da studi qualitativi di riconosciuto valore metodologico

12) In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito nella cavità pleurica deve:

- a. essere collegato a un sistema di aspirazione con dispositivo a valvola d'acqua
- b. restare clampato per le prime 4-8 ore
- c. essere collegato a un sistema di aspirazione senza dispositivo a valvola
- d. essere collegato ad un sacchetto di raccolta sterile e a caduta

13) L'evidence based nursing (EBN) è:

- a. un insieme di linee guida basate su studi scientifici comprovati
- b. una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di nursing
- c. un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristiche erogate sono basate su rassegne sistematiche
- d. un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sono basate su prove di efficacia

14) L'angina pectoris è spesso provocata da:

- a. vomito
- b. prolungata stazione eretta
- c. assunzione di alcolici
- d. sforzi fisici intensi

15) Le persone con gruppo sanguigno AB RH+:

- a. sono riceventi universali
- b. possono ricevere sangue solo da AB+ e A+
- c. sono donatori universali
- d. possono donare sangue solo a AB+

16) Cosa è il respiro di Kussmaul:

- a. un respiro russante con rantoli crepitanti alle basi
- b. periodi di apnea alternati regolarmente a una serie di respiri superficiali di uguale profondità
- c. una dispnea con stridore laringeo
- d. una sequenza di respiri profondi regolari seguiti ciascuno da una pausa protratta

17) Nella cirrosi epatica quali sono le misure idonee a ridurre la nausea:

- a. alimentarsi in ambiente arieggiato. Astenersi dal riposo post-prandiale. Astenersi dalla preparazione del cibo
- b. applicare una forte pressione a livello epigastrico per rallentare le contrazioni del diaframma
- c. evitare l'odore della preparazione dei cibi. Sbottonarsi i vestiti al momento di mangiare. Evitare il riposo post-prandiale per almeno due ore dopo il pasto
- d. evitare l'odore della preparazione dei cibi. Sbottonarsi i vestiti al momento di mangiare.

18) Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:

- a. sul mitto intermedio
- b. sul mitto iniziale
- c. tutte le alternative proposte sono corrette
- d. nessuna delle alternative proposte è corretta

19) La rottura di un aneurisma endocranico determina un'emorragia:

- a. intra-chiasmatica
- b. intraparenchimale
- c. subdurale
- d. subaracnoidea

20) Facendo riferimento alle linee guida per la prevenzione delle infezioni da cateteri intravascolari emanate dal CDC/MMWR nel 2002, quale tra le seguenti raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni è vera:

- a. le linee infusive devono essere sostituite almeno una volta per turno
- b. le linee infusive devono essere sostituite ogni 2 mesi
- c. le linee infusive devono essere cambiate ogni 12 ore
- d. le linee infusive usate per la somministrazione di emoderivati o emulsioni di lipidi devono essere cambiate entro 24 ore dall'inizio dell'infusione

21) Per "spettro antibiotico" si intende:

- a. l'insieme degli agenti non patogeni sensibili all'azione di un antibiotico
- b. l'insieme degli agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico
- c. il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
- d. l'insieme degli agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico

22) Il catetere più indicato per la PVC è quello di Swan-Ganz. Questo viene posizionato:

- a. nell'atrio destro, per valutare la funzionalità del ventricolo destro
- b. nella vena cava inferiore
- c. nel ventricolo sinistro
- d. nel ventricolo destro, per valutare il ritorno venoso al cuore

23) A chi spetta la determinazione dei livelli essenziali di assistenza:

- a. ospedale
- b. Regioni
- c. Stato
- d. Stato - Regioni

24) Nel paziente etilista, la sospensione dell'assunzione di alcool provoca:

- a. bradipnea e ipotensione entro 5-10 ore
- b. stato di euforia dopo 5-10 ore
- c. delirium tremens dopo 3-5 giorni
- d. sonnolenza e ipotensione quasi immediatamente

25) La teorica dell'assistenza infermieristica che ha elaborato il modello dell'assistenza transculturale è:

- a. Florence Nightingale
- b. Virginia Henderson
- c. Dorothea E. Orem
- d. Madeleine Leininger

26) La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:

- a. D. Lgs 230/1995 e s.m.i.
- b. D. Lgs 187/2000 e s.m.i.
- c. D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
- d. D. Lgs 178/2000 e s.m.i.

27) La nutrizione parenterale una volta preparata:

- a. deve essere somministrata entro 24 ore e deve essere conservata in frigorifero
- b. deve essere somministrata subito
- c. deve essere somministrata entro 12 ore
- d. deve essere somministrata entro 24 ore

28) Il Barthel index è:

- a. uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della vita quotidiana di una persona e quindi la sua autosufficienza
- b. uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane
- c. uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
- d. un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale

29) Secondo le indicazioni del CDC di Atlanta (Cat. II), ogni quanto deve avvenire normalmente il cambio della medicazione di una via venosa periferica:

- a. ogni turno di servizio
- b. ogni 48/72 ore
- c. ogni volta che si medicano altre ferite
- d. ogni 24 ore

30) Quale è il meccanismo di azione degli analgesici oppiacei?

- a. nessuna delle alternative proposte è corretta
- b. inibizione della sintesi delle prostaglandine
- c. blocco della trasmissione dolorifica lungo le vie nervose
- d. interazione con i recettori delle encefaline e delle endorfine

