



REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - PROFILO DI INFERMIERE.

07/05/2024

PROVA SCRITTA N. 2

PROVA SCRITTA

2024

PROVA

PROVA SCRITTA N. 2

- 1) **Se, durante una trasfusione di globuli rossi, il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
- diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
 - sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - diminuire la velocità di infusione continuando la trasfusione poiché tali sintomi sono para- fisiologici
 - diminuire la velocità di infusione e avvisare il centro trasfusionale
- 2) **Quale normativa sancisce l'abrogazione del mansionario dell'infermiere e la fine dell'ausiliarietà della professione infermieristica:**
- Legge n. 42/1999
 - D. Lgs. n. 229/1999
 - D. Lgs n. 502/1992
 - D.P.C.M. n. 502/1992
- 3) **Un uomo, affetto da ipertensione arteriosa non ben compensata da molti anni, da un pò di tempo presenta dispnea per piccoli sforzi ed è costretto a dormire con tre cuscini per evitare l'affanno respiratorio durante la notte, devo pensare a:**
- bronco pneumopatia cronica ostruttiva
 - cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco destro
 - cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco sinistro
 - asma allergico
- 4) **Nel paziente incosciente in decubito supino la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:**
- flessione della glottide
 - ostruzione della laringe da alimento non digerito
 - flessione dell'epiglottide
 - caduta della lingua all'indietro
- 5) **Valutando il sito di inserimento di un catetere venoso periferico utilizzando la scala VIPS (Visual Infusion Phlebitis Score), la cannula va rimossa se il punteggio è uguale o superiore a:**
- quattro
 - due
 - uno
 - zero
- 6) **La qualità media del controllo glicemico in un arco temporale di 2-3 mesi si può controllare con un esame che si chiama:**
- test da carico orale di glucosio
 - glicemia a digiuno
 - glicosuria
 - test dell'emoglobina glicata

7) L'atassia è:

- a. un'improvvisa ipoacusia
- b. la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
- c. la perdita della capacità di parlare
- d. la differenza del diametro delle due pupille

8) Con il termine stranguria si intende:

- a. la necessità frequente di eliminazione dell'urina durante il riposo notturno
- b. l'eccessiva quantità di urina prodotta
- c. l'elevata frequenza delle minzioni
- d. la minzione difficoltosa e dolorosa

9) La guarigione di una ferita per seconda intenzione:

- a. riguarda ferite profonde ma non estese
- b. avviene quando i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima
- c. avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente
- d. avviene quando si rende necessaria la riapertura di una ferita e poi si procede nuovamente alla sutura

10) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:

- a. secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, oliguria e palpitazioni
- b. secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- c. secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- d. secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria

11) Tra i seguenti il farmaco chemioterapico che deve essere conservato al riparo dalla luce in quanto fotosensibile è:

- a. la bleomicina
- b. il sorafenib
- c. la vincristina
- d. il metotrexate

12) Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica:

- a. operato di resezione intestinale in prima giornata
- b. corpi estranei ferromagnetici in sedi non vitali
- c. portatore di pacemaker
- d. claustrofobico

13) Il periodo di incubazione della meningite meningococcica è:

- a. 3-4 giorni
- b. 10-15 giorni
- c. 15-30 giorni
- d. può insorgere anche dopo mesi dal contagio

14) Nella somministrazione di sacche per NPT, l'infermiere ha attribuite precise responsabilità:

- a. controllo di eventuali precipitati, applicazione di filtri, monitoraggio durante l'infusione
- b. conservazione della sacca e somministrazione in tempi opportuni
- c. controllo di eventuali precipitati, applicazione di filtri, conservazione e somministrazione in tempi opportuni
- d. conservazione in frigo e somministrazione riscaldata, applicazione di filtri, monitoraggio parametri vitali durante la somministrazione

15) Nell'esame emocromocitometrico, il valore normale dei leucociti per un soggetto adulto sano è:

- a. 140.000-300.000
- b. 4.200.000-5.200.000
- c. 40.000-100.000
- d. 4.000-10.000

16) Quali segni e sintomi sono caratteristici del quadro di scompenso cardiaco:

- a. dispnea espiratoria, edemi declivi, febbre
- b. ascite, ortopnea, astenia
- c. febbre, dispnea e dolore toracico
- d. ortopnea, edemi declivi, astenia

17) Nel processo di pianificazione assistenziale l'analisi dei dati è:

- a. un processo di ragionamento induttivo per decidere quali tra i dati oggettivi e soggettivi raccolti
- b. un processo di ragionamento deduttivo per decidere quali tra i dati oggettivi e soggettivi raccolti abbiano importanza per individuare il problema di salute del paziente
- c. un processo che inizia con la definizione degli obiettivi e i risultati attesi e continua con la selezione degli interventi
- d. un processo di conferma dell'accuratezza dei dati raccolti che ha lo scopo di comparare i dati oggettivi e soggettivi, di assicurare la consistenza degli indizi, ed attuare un duplice controllo sui dati fortemente alterati

18) Il consenso all'atto medico deve essere richiesto al paziente:

- a. solo in caso di pazienti interdetti
- b. in nessun caso
- c. sempre
- d. solo in caso di manovre pericolose

19) Nella scala di Glasgow il punteggio che indica lo stato di coma è:

- a. superiore a 10
- b. pari o superiore a 12
- c. inferiore a 7
- d. inferiore a 5

20) L'osteosarcoma è:

- a. un tumore benigno congenito dell'osso
- b. un tumore maligno primitivo dell'osso
- c. un difetto di consolidazione
- d. un difetto dell'osso

21) Il lumen del sondino di Sengstaken-Blakemore è:

- a. triplo
- b. doppio
- c. singolo
- d. a un lume

22) Indicare quale delle seguenti affermazioni non fa parte delle fasi del processo di assistenza infermieristica:

- a. accertamento e diagnosi
- b. pianificazione e attuazione
- c. identificazione degli obiettivi
- d. prevenzione dei rischi

23) La teoria dei bisogni, nelle discipline infermieristiche, è un modello teorico elaborato da:

- a. V Henderson
- b. A. Maslow
- c. J. Travelbee
- d. S. Snell

24) Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:

- a. la scala ADL di Katz
- b. la scala di Likert
- c. la scala di Cheops
- d. la scala di Conley

25) I modelli funzionali (fisiologici) specificati da Gordon NON includono:

- a. riposo e sonno
- b. attività ed esercizio fisico
- c. sessualità e riproduzione
- d. prevenzione dei rischi

26) Con l'espressione anglosassone "Evidence Based Nursing" si intende:

- a. l'uso, nella pratica infermieristica, di modelli logici e procedure deduttive
- b. l'uso, nella pratica infermieristica, di verifiche empiriche in associazione con diagnosi cliniche
- c. l'accentuazione delle problematiche socio-sanitarie in contesti politico-istituzionali
- d. nessuna delle precedenti

27) Indicare la finalità del triage all'ingresso in pronto soccorso:

- a. l'assegnazione a ogni paziente di un numero che definisca l'ordine di arrivo
- b. l'agevolazione dell'accesso alle cure non sulla base dell'ordine di arrivo ma della gravità delle condizioni
- c. la compilazione della cartella clinica
- d. nessuna delle precedenti

28) Il personale obiettore può rifiutarsi di prestare assistenza antecedente o conseguente all'intervento diretto, che determina l'interruzione della gravidanza alle donne che abortiscono:

- a. solo se qualcun altro può prestare assistenza al posto loro
- b. solo in alcune Regioni
- c. in alcuni casi
- d. no

29) Nella sperimentazione clinica, viene definito gruppo di controllo il gruppo:

- a. del campione complessivo di riferimento
- b. di pazienti che non ricevono il trattamento in oggetto
- c. di pazienti oggetto che ricevono il trattamento
- d. nessuna delle precedenti

30) Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto:

- a. ipotensione marcata, sonnolenza, dispnea
- b. dispnea, febbre, decubito supino obbligato
- c. dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso
- d. dispnea, cianosi

