

PROVA 2 ESTRATTA

PROVA SCRITTA 2 GRUPPO 1

Daniela Amoretti

1	Quale malattia è monitorata nelle volpi:
	a) pseudorabbia
	b) leptospirosi
	c) rabbia silvestre
2	Il Piano di profilassi della Tubercolosi bovina Piemonte è:
	a) regionale
	b) nazionale
	c) fondato su basi normative unionali e nazionale, redatto secondo i criteri di assegnazione delle qualifiche
3	L'acronimo BDN sta per:
	a) banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche
	b) neuronale bovine disease
	c) banca dati delle neuropatie animali
4	Per animale sospetto di infezione da TSE, si intende:
	a) un animale vivo, abbattuto o morto, che presenta o ha presentato turbe neurologiche o comportamentali o un progressivo deterioramento dello stato generale connesso ad una lesione del SNC
	b) un ruminante morto o macellato in cui l'esame dell'obex abbia dato risultato positivo ad un iniziale test diagnostico rapido e per il quale non si è avuta ancora conferma
	c) entrambe le precedenti
5	L'agente causale della Varroa è:
	a) ixodes ricinus
	b) varroa destructor
	c) aethina tumida
6	Il controllo degli aborti in territori ufficialmente indenni da Brucellosi:
	a) è importante e va mantenuto
	b) viene abbandonato
	c) viene attivato occasionalmente come ulteriore sorveglianza in caso di sospetti sierologici
7	Quali aziende bovine devono essere sottoposte a controlli supplementari per Brucellosi con il test Elisa latte:
	a) quelle che commercializzano latte
	b) quelle che producono formaggi
	c) quelle che praticano l'alpeggio
8	Il piano di controllo 2022-2024 delle Salmonellosi negli avicoli prevede, per gli allevamenti di tacchini all'ingrasso:
	a) l'esecuzione di un campionamento ufficiale casuale su un gruppo di tacchini ogni anno
	b) l'esecuzione di un campionamento in autocontrollo su tutti i gruppi di tacchini presenti, entro tre settimane prima della macellazione
	c) l'esecuzione di un campionamento casuale su un gruppo di tacchini durante la loro permanenza in allevamento
9	Qual è l'età minima dei bovini per poter effettuare la prova tubercolinica:
	a) un anno
	b) sei settimane
	c) sei mesi

[Handwritten signature]

10	Negli allevamenti con presenza di muli i prelievi di sangue per la diagnosi di Anemia Infettiva Equina devono essere eseguiti:
	a) ogni tre anni
	b) ogni cinque anni
	c) ogni anno
11	Al tampone di tessuto effettuato per la ricerca di Salmonella in incubatoio occorre aggiungere:
	a) soluzione fisiologica e alcool
	b) alcool
	c) acqua peptonata tamponata
12	La Regione Piemonte è considerata ad alto rischio per la West Nile Disease:
	a) sì
	b) no
	c) non più
13	Qual è il destino dei capi ovini maschi portatori di allele VRQ:
	a) macellazione entro 90 giorni dall'esito
	b) macellazione entro 30 giorni dall'esito
	c) castrazione
14	Se lo spessore della pelle di un bovino, cui è stata iniettata la tubercolina, ha avuto un aumento tra 2 e 4 mm la prova deve essere considerata:
	a) positiva
	b) dubbia
	c) negativa
15	In quali casi è utile sterilizzare i gatti presenti in una colonia felina:
	a) sempre al fine di impedire l'incremento numerico della colonia
	b) solo nel caso in cui i gatti insistano in scuole e/o ospedali
	c) solo nel caso in cui ci siano problemi con i cani
16	Ai fini del piano di eradicazione della Scrapie Classica la genotipizzazione va estesa anche agli ovini di sesso femminile:
	a) sì ma solo in seguito alla costituzione di gruppi di monta autorizzati dal Servizio Veterinario Regionale
	b) solo se in azienda non sono più presenti ovini maschi
	c) no
17	Cosa si intende per Documento Unico di Identificazione a Vita:
	a) il passaporto dei cani
	b) il modello 4 informatizzato dei bovini
	c) il documento di identificazione degli equini
18	Per quali specie il prelievo per anemia infettiva va eseguito a cadenza annuale:
	a) muli ed equini da lavoro
	b) asini
	c) cavalli
19	Per quale specie tra le seguenti è disponibile un vaccino contro la West Nile Disease:
	a) cavallo
	b) bovino
	c) ovino
20	L'agente eziologico della rabbia è un:
	a) lyssavirus
	b) meningococco
	c) herpesvirus

ma *re* *q*

21	In quale periodo dell'anno è obbligatorio inserire il censimento apistico in Banca Dati Nazionale:
	a) periodo primaverile di ogni anno
	b) periodo estivo di ogni anno
22	c) tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno
	Quale dimensione deve avere il cartello riportante il codice identificativo apistico:
	a) di un foglio di carta di dimensioni A3
23	b) di un foglio di carta di dimensioni A4
	c) non ci sono dimensioni obbligatorie
	Il codice identificativo dell'apicoltore
24	a) è univoco per tutto il territorio nazionale
	b) è valido solo in ambito regionale
	c) è valido solo in ambito provinciale
25	In caso di riscontro di sierotipi rilevanti di Salmonella a seguito di campionamento ufficiale in allevamento avicolo:
	a) si deve sottoporre immediatamente l'allevamento a vincolo sanitario
	b) si devono ripetere le prove
26	c) occorre effettuare solamente un'indagine epidemiologica
	In Europa il virus della Peste Suina Africana viene trasmesso da zecche:
	a) sì
27	b) no
	c) sì ad alte temperature ambientali
28	Cosa si intende per intradermotubercolinizzazione comparativa:
	a) inoculazione di ppd bovina sia sul lato destro che su quello sinistro del collo
	b) inoculazione contemporanea di tubercolina aviaria e bovina
29	c) inoculazione della tubercolina in animale di specie diversa dal bovino
	Qual è lo scopo del Piano Nazionale di controllo delle Salmonellosi avicole:
	a) eliminare dagli allevamenti avicoli i sierotipi di salmonella rilevanti:
30	b) ridurre negli allevamenti avicoli la prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella
	c) ridurre negli allevamenti avicoli la prevalenza dei sierotipi non rilevanti di Salmonella
31	Quale deve essere la periodicità dei controlli ufficiali per Salmonella negli incubatoi:
	a) almeno due volte l'anno
	b) almeno quattro volte l'anno
32	c) almeno una volta l'anno
	La programmazione dei campionamenti in autocontrollo in base al piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli allevamenti di galline ovaiole deve prevedere:
	a) un campionamento casuale su ciascun gruppo
33	b) un campionamento nei 21 giorni precedenti la macellazione
	c) un campionamento su ciascun gruppo di ovaiole dell'allevamento ogni 12 settimane di permanenza a partire dalle 24 settimane
34	Possono essere richiesti in Banca Dati Nazionale degli identificativi per il solo Piano Scrapie:
	a) sì richiedendo una sola marca mentre la seconda verrà eventualmente richiesta dopo l'esito del prelievo
	b) no occorre usare le marche che si hanno a disposizione
35	c) sì, occorre ordinare la doppia marca auricolare

Handwritten signature and initials, possibly reading 'ME' and 'f me'.

PROVA 3 NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA 3 GRUPPO 1

Daniela Chierici

1	Quale malattia viene monitorata nei cinghiali:
	a) pseudorabbia
	b) peste suina africana
	c) rabbia silvestre
2	La diagnosi per il mantenimento della qualifica per Brucellosi negli allevamenti bovini da riproduzione nel territorio Piemontese:
	a) viene fatta esclusivamente con esame sierologico sui capi superiori a 24 mesi
	b) può essere fatta con esame sierologico sui capi di età superiore ai 24 mesi o, nelle aziende produttrici di latte, anche attraverso il controllo del latte di massa con tre controlli l'anno
	c) si fa esclusivamente sul latte (3 controlli l'anno) e solo nelle aziende da latte perché più a rischio
3	In quali allevamenti avicoli è consentito un piano di autocontrollo per Salmonella semplificato:
	a) negli allevamenti commerciali con meno di 250 capi
	b) negli allevamenti con presenza di soli maschi
	c) negli allevamenti di tacchini
4	Ai fini del rilascio del passaporto per animali d'affezione è indispensabile:
	a) l'identificazione attraverso microchip e la registrazione del soggetto nella banca dati regionale degli animali d'affezione:
	b) la fotografia dell'animale che ne identifichi la peculiarità
	c) solo il documento d'identità del proprietario e del detentore
5	La porzione anatomica definita obex è:
	a) una porzione di midollo spinale cervicale
	b) la porzione più aborale del tronco encefalico dove si trovano i nuclei indicati come prima sede di accumulo della PrPsc
	c) una porzione encefalico/spinale
6	Gli allevamenti famigliari avicoli sono esentati dal Piano nazionale Salmonella:
	a) no
	b) sì, fatte salve disposizioni diverse del Servizio Veterinario
	c) solo se producono uova
7	Quali malattie infettive sono soggette ai piani di controllo obbligatori negli allevamenti bovini:
	a) TBC, BRC, LEB, PARATBC, Blue Tongue
	b) Blue Tongue PARATBC IBR
	c) IBR BRC
8	I controlli in condizionalità del sistema di identificazione e registrazione prevedono:
	a) l'utilizzo di apposite check list predisposte dai servizi veterinari
	b) la compilazione di apposite check list predisposte dal Servizio Veterinario Regionale
	c) l'utilizzo di apposite check list ministeriali scaricabili dal sito della BDN
9	L'agente causale dell'IBR è:
	a) flavivirus
	b) herpesvirus
	c) lentivirus
10	Qual è l'età minima dei bovini per poter effettuare la prova tubercolinica:
	a) un anno
	b) sei mesi
	c) sei settimane

11	L'agente causale della PSA è:
	a) morbillivirus
	b) retrovirus
	c) flavivirus
12	Quale insetto trasmette il virus della West Nile:
	a) mosca
	b) zanzara
	c) pulce
13	In quali allevamenti deve essere applicato il piano nazionale salmonella (PNCS):
	a) bovini
	b) suini
	c) avicoli
14	Se lo spessore della pelle di un bovino cui è stata iniettata la tubercolina ha avuto un aumento inferiore a 2 mm la prova deve essere considerata:
	a) positiva
	b) dubbia
	c) negativa
15	Durante la visita ante mortem in un allevamento avicolo si deve controllare in particolare:
	a) la presenza di lesioni podali
	b) la presenza di lesione alla cresta
	c) la presenza di lesioni alle penne
16	In quali aziende ovine con presenza di nove capi è obbligatoria l'adesione al piano di selezione genetica per l'eradicazione della scrapie classica:
	a) nel caso in cui ci siano almeno cinque maschi
	b) quando vi sono rapporti di promiscuità con altre greggi coinvolte nel piano
	c) mai
17	Entro quanti giorni dalla nascita devono essere identificati i suini:
	a) 70 giorni
	b) 50 giorni
	c) 30 giorni
18	Per la diagnosi di quale malattia può essere utilizzato il latte di massa:
	a) Tubercolosi
	b) Brucellosi
	c) entrambe le precedenti
19	Come si trasmette la West Nile:
	a) tramite punture di zanzare
	b) per contatto diretto
	c) nessuna delle precedenti
20	Nella Regione Piemonte qual è l'età diagnostica minima per la diagnosi sierologica di Brucellosi negli ovicapriini:
	a) 1 anno
	b) 6 mesi
	c) 24 mesi
21	A quale data deve essere riferito il censimento degli allevamenti suini:
	a) 31 agosto
	b) 28 febbraio
	c) 31 marzo

22	Indicare la sequenza corretta del codice identificativo in anagrafe apistica:
	a) IT- Codice istat Comune- Sigla Provincia-Numero progressivo azienda
	b) sigla provincia-numero assegnato all'attività apistica
	c) IT- sigla provincia- codice Istat Comune
23	Cosa deve riportare il cartello identificativo dell'apicoltore:
	a) il nome dell'apicoltore
	b) il codice dell'attività apistica
	c) il numero delle arnie presenti
24	In caso di positività per Salmonella rilevante in un allevamento di galline ovaiole, qual è il destino delle uova:
	a) possono essere avviate al consumo previa cottura
	b) devono essere distrutte oppure essere considerate di categoria B
	c) nessuna delle due precedenti risposte
25	E' importante la campagna d'informazione della Peste Suina Africana nei cacciatori:
	a) sì
	b) no
	c) sì ma solo per la caccia in zone di pianura
26	Quale dose di PPD bovina va iniettata nella prova di intradermotuberculinizzazione dei bovini:
	a) 0,3 ml
	b) 0,2 ml
	c) 0,1 ml
27	In quali allevamenti avicoli è consentito un piano di autocontrollo semplificato per Salmonella:
	a) negli allevamenti commerciali con meno di 250 capi
	b) negli allevamenti commerciali con meno di 50 capi
	c) negli allevamenti di tacchini
28	Nei polli da carne e nei tacchini il campione ufficiale per la ricerca di Salmonella deve essere composto da:
	a) 4 sovrascarpe, una ogni 25 metri quadrati di superficie
	b) 2 paia di sovrascarpe, una ogni 50% dell'area calpestabile
	c) 1 sovrascarpa per tutta la superficie
29	Le schede di accompagnamento dei campioni per la ricerca di Salmonella in un allevamento avicolo, vanno compilate:
	a) una per ogni gruppo
	b) una sola per tutto l'allevamento
	c) una per ogni capannone
30	Possono essere richiesti in Banca Dati Nazionale degli identificativi per il solo piano scrapie:
	a) sì ma una sola marca auricolare, mentre la seconda verrà richiesta dopo l'esito del prelievo
	b) no occorre usare le marche che si hanno a disposizione
	c) sì e occorre ordinare doppia marca auricolare

PROVA 1 NOV ESTRATTA

PROVA SCRITTA 1 GRUPPO 1

Donato Chiorini

1	Per zoonosi si intendono:
	a) malattie che si trasmettono tra diverse specie di animali
	b) malattie trasmesse dagli animali all'uomo
	c) malattie degli animali che vivono negli zoo
2	Il piano nazionale di sorveglianza nei confronti della Blue Tongue prevede:
	a) l'effettuazione di controlli sierologici e virologici su una rete di animali sentinella e la cattura di insetti vettori
	b) la ricerca degli insetti vettori
	c) il trattamento antiparassitario di ovini e caprini presenti sul territorio
3	La profilassi dell'anemia Infettiva degli equini riguarda:
	a) gli asini, i bardotti, i cavalli e i muli
	b) solo i cavalli
	c) solo i muli
4	L'intradermotuberculinizzazione unica è:
	a) una prova diagnostica individuale per la Tuberculosis Bovina
	b) una prova diagnostica d'allevamento per la Tuberculosis Bovina
	c) una prova diagnostica individuale per la Rinotracheite Infettiva Bovina
5	Qual è la definizione di sospetto clinico di Paratuberculosis in base alle linee guida Ministeriali:
	a) caso di diarrea cronica associata a cachessia in bovino di età superiore a 24 mesi
	b) caso di diarrea cronica associata a cachessia in bovino di età superiore a 24 e bovini clinicamente sani risultati positivi al test sierologico
	c) caso di diarrea cronica o di cachessia in bovino di età superiore ai 24 mesi
6	I controlli previsti dai piani di profilassi della Brucellosi Bovina e Ovicaprina si attuano attraverso:
	a) intradermoreazione
	b) prelievi ematici
	c) tampone e test rapido
7	Al tampone di tessuto effettuato per la ricerca di Salmonella in incubatoio occorre aggiungere:
	a) soluzione di alcool con fisiologica
	b) solo alcool
	c) acqua peptonata tamponata
8	Il protocollo per l'acquisizione su base volontaria delle qualifiche sanitarie di Paratbc prevede:
	a) il controllo sierologico di tutti i bovini di età superiore a 24 mesi
	b) esami diagnostici diretti sugli animali risultati positivi a precedenti test sierologici
	c) il controllo di una percentuale stabilita di bovine superiore ai 36 mesi, di maschi superiore ai 24 mesi e il controllo dei riproduttori di età superiore ai 24 mesi acquistati negli ultimi 12 mesi
9	Le schede di accompagnamento dei campioni per la ricerca di Salmonella vanno compilate:
	a) una per ogni capannone
	b) una sola per tutto l'allevamento
	c) una per ogni gruppo
10	La sorveglianza passiva sui cinghiali prevista dal piano nazionale di sorveglianza della Peste Suina Africana in Italia prevede il prelievo dei seguenti organi di elezione:
	a) fegato e cervello
	b) milza e osso lungo
	c) polmone e timo

[Handwritten signatures]

11	Il piano di monitoraggio della Brucellosi ovis-caprina in aree riconosciute ufficialmente indenni:
	a) è su base quinquennale nella maggior parte delle aziende con controlli supplementari annuali in base alla valutazione del rischio
	b) Si effettua solo nelle aziende che praticano il pascolo vagante e l'alpeggio
12	Quale specie rappresenta il serbatoio naturale della West Nile:
	a) uccelli selvatici
	b) cavallo
13	Il piano per l'eradicazione della Scrapie classica non è obbligatorio nelle aziende che allevano per il solo autoconsumo e che abbiano un numero di capi:
	a) fino a 9
	b) fino a 15
14	La leptospirosi è una zoonosi:
	a) sì
	b) no
15	Qual'è la percentuale utile del locale di isolamento di un canile rapportato alla capienza totale:
	a) 5%
	b) 10%
16	Qual è la finalità del piano di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie:
	a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR
	b) l'incremento della frequenza dell'allele ARQ
17	Di quale colore sono i contrassegni auricolari utilizzati per l'identificazione dei montoni recanti l'allele ARR in omozigoti (ARR/ARR)
	a) giallo
	b) bianco
18	Il cartello indicante il codice apistico:
	a) va posizionato vicino all'apiario e deve essere leggibile
	b) va posizionato a 50 metri dall'apiario
19	Come si manifesta la West Nile Disease negli uccelli selvatici:
	a) con sintomi gastroenterici
	b) con sintomi polmonari
20	Come si manifesta la West Nile Disease negli uccelli selvatici:
	a) con sintomi gastroenterici
	b) con sintomi polmonari
21	Quali aziende bovine devono essere sottoposte a controlli supplementari del test Elisa Latte:
	a) le aziende che commercializzano latte
	b) le aziende che producono formaggi
22	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
23	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
24	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
25	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
26	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
27	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
28	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
29	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
30	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
31	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
32	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
33	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
34	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
35	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
36	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
37	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
38	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
39	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
40	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
41	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
42	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
43	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
44	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
45	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
46	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
47	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
48	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
49	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
50	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
51	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
52	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
53	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
54	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
55	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
56	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
57	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
58	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
59	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
60	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
61	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
62	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
63	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
64	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
65	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
66	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
67	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
68	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
69	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
70	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
71	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
72	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
73	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
74	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
75	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
76	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
77	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
78	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
79	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
80	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
81	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
82	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
83	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
84	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
85	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
86	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
87	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
88	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
89	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
90	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
91	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
92	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
93	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
94	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
95	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
96	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
97	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
98	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
99	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre
100	Quando è consigliato effettuare la prova tubercolinica su capi bovini acquistati:
	a) mai
	b) sempre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22	L'agente eziologico della rabbia è un:
	a) meningococco
	b) lyssavirus
	c) herpesvirus
23	L'apicoltore può delegare un altro soggetto ad operare per l'aggiornamento in BDN:
	a) sì
	b) no
	c) solo nei casi in cui non abbia accesso alla rete
24	In caso di riscontro di sierotipi non rilevanti di Salmonella a seguito di campionamento ufficiale in allevamento avicolo:
	a) non è necessario eseguire alcuna procedura particolare
	b) prima di tutto occorre effettuare un'indagine epidemiologica
	c) si devono ripetere immediatamente le prove
25	Il virus della Peste Suina Africana:
	a) viene inattivato dalla refrigerazione
	b) viene inattivato a temperature di 70 gradi per 30 minuti
	c) è poco stabile
26	Qual' è l'età minima dei bovini per poter effettuare la prova tubercolinica:
	a) 1 anno
	b) 6 settimane
	c) 6 mesi
27	Quale zanzara è portatrice di West Nile virus
	a) aedes Koreicus
	b) zanzara tigre
	c) culex pipiens
28	Il campione di salmonella sia ufficiale che in autocontrollo nei riproduttori gallus gallus e tacchini per ciascun gruppo deve essere composto da:
	a) n. 4 sovrascarpe una ogni 25 metri quadrati della superficie occupata dal gruppo
	b) n. 5 sovrascarpe rappresentanti ciascun paio il 20% della superficie occupata dal gruppo
	c) n. 1 sovrascarpa per tutto il gruppo
29	Cosa si intende con l'acronimo SIMAN:
	a) Sistema Informativo Notifica Malattie Animali
	b) Sistema Informativo Nazionale Malattie Animali
	c) Sistema Internazionale Notifica Malattie Animali
30	Gli autocontrolli per salmonella nei polli da carne vanno effettuati:
	a) quando si ritiene opportuno
	b) entro le tre settimane dalla data di macellazione
	c) all'arrivo dei pulcini in allevamento