



# Monitoraggio e valutazione dei suini durante il trasporto



ANIMAL TRANSPORT GUIDES

Pag. 1

Per la guida completa e ulteriori informazioni:  
[www.animaltransportguides.eu](http://www.animaltransportguides.eu)



## “Cosa osservare negli animali durante il trasporto e la sosta?”

I punti focali su cui concentrarsi durante il trasporto, durante le soste e all'arrivo:

1



### Gli animali sono calmi e quieti?

Gli animali devono stare distesi senza vocalizzare, urlare e/o lottare

2



### Osservare la posizione dei suini

Sono in piedi? Distesi? Con temperature elevate, i suini occupano tutto lo spazio. Con il freddo si accalcano.

3



### Durante le soste, senti gli animali tossire?

4



### I suini ansimano?

In caso di temperature elevate, questo è un chiaro segnale della necessità di modulare la ventilazione.

5



### Durante il viaggio gli animali sono puliti?

Ciò riguarda anche la presenza di sangue, bava alla bocca e scolo nasale e/o oculare.

6



### Stato fisico dei suini durante il trasporto

Tutti i suini sono idonei per un ulteriore trasporto? Cfr. *“Orientamenti pratici per la valutazione dell'idoneità dei suini al trasporto”*



## Rapido controllo delle attrezzature del camion a ogni sosta



### CHECKLIST

- ✓ Regolazione delle ventole e dei flap laterali
- ✓ Sistema di abbeverata
- ✓ Monitoraggio della temperatura nella cabina e valutazione all'interno del camion
- ✓ Allarmi
- ✓ Videocamera, se in dotazione

## “Quali operazioni effettuare?”

Effetti negativi	Osservazioni	Operazione
<b>Fame</b>	<i>Perdita di peso</i>	I suini non devono essere alimentati sul camion, perchè potrebbero soffrire di chinetosi. Aspettare fino all'arrivo o scaricare i suini per 24 ore per nutrirlti. Controllare il sistema di abbeverata.
<b>Disidratazione</b>	<i>Sete, pelle raggrinzita,</i>	Fornire acqua fresca, ma non troppo fredda. I suini devono avere accesso continuo al sistema di abbeverata durante il trasporto.
<b>Mancanza di confort e di riposo</b>	<i>I suini sono sporchi, rimangono in piedi tutto il tempo e non si distendono mai</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungere lettiera</li> <li>• Modulare l'ampiezza dei box a seconda dei suini trasportati</li> <li>• Adattare la ventilazione regolando il sistema di ventilazione forzata e/o i flap dei pannelli laterali</li> </ul>
<b>Scarsa ventilazione</b>	<i>Iperventilazione insolita dei suini con la bocca aperta e la frequenza respiratoria veloce.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la ventilazione e la temperatura interna</li> <li>• Fornire ventilazione sufficiente ai suini: aprire tutti i flap laterali e accendere il sistema di ventilazione, se in dotazione</li> <li>• Evitare di sostare con il mezzo in un luogo al caldo (es. luogo assolato)</li> <li>• L'aspersione di acqua può essere richiesta in caso di temperature davvero elevate</li> </ul>
<b>Stress da calore</b>	<i>Suini che ansimano</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire immediatamente tutti i flap laterali e azionare il sistema di ventilazione, se in dotazione</li> <li>• Utilizzare spruzzatori in caso di temperature davvero elevate</li> </ul>
<b>Stress da freddo</b>	<i>Brividi, colore della pelle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridurre le aperture e controllare la temperatura interna</li> <li>• Utilizzare più materiale da lettiera (es. segatura) per aumentare l'isolamento del pavimento a contatto con i suini</li> </ul>
<b>Stanchezza</b>	<i>Apatia, riluttanza al movimento, prostrazione, collasso, mortalità</i>	Consultare un veterinario
<b>Malattia</b>	<i>Prostrazione, collasso, mortalità, fuoriuscite nasali e oculari, respirazione anomala, diarrea, sangue nelle feci</i>	Consultare un veterinario
<b>Ferita / dolore</b>	<i>Zoppia, riluttanza al movimento, postura del corpo anomala, lesioni della pelle, articolazioni e zampe gonfie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare un veterinario</li> <li>• Cercare di separare il suino o i suini feriti, altrimenti scaricarli nel punto più vicino</li> </ul>
<b>Facilità di movimento</b>	<i>Scivolamenti e cadute</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che la pavimentazione del camion, la rampa e/o la via da e per l'area di riposo non siano scivolose</li> <li>• Ridurre la pendenza della rampa il più possibile</li> <li>• Fornire un chiaro e facile accesso al camion attraverso la banchina di carico</li> <li>• Gestire i suini in gruppi e lasciare loro tempo sufficiente per muoversi in modo sicuro</li> </ul>
<b>Paura</b>	<i>Vocalizzazione, allontanamento, riluttanza al movimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione lenta</li> <li>• I gruppi di suini vanno conservati durante il carico</li> <li>• Verificare la direzione della luce durante lo scarico</li> </ul>
<b>Stress da isolamento o mix</b>	<i>Lesioni della pelle, lotta</i>	Evitare di mischiare suini estranei fra loro
<b>Chinetosi</b>	<i>I suini sono molto stressati e possono vomitare e morire durante il trasporto</i>	Un periodo di digiuno prima del carico e del trasporto è necessario, almeno 6-12 ore prima del carico in allevamento ma in ogni caso in base alla durata del viaggio.