Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284 www.aslvc.piemonte.it Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Comunicazione ai sensi della Legge 648/1996

ARIPIPRAZOLO, LITIO PIMOZIDE, RISPERIDONE nel trattamento dei disturbi psichici in eta'evolutiva.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo ai medicinali con uso consolidato per il trattamento di patologie del sistema nervoso ed apparato muscoloscheletrico (Allegato P8).

Con Determina AIFA 75065/2019 viene estesa la rimborsabilità SSN, ai sensi della Legge n° 648/1996, come di seguito elencato, per i medicinali per uso umano:

- * Aripiprazolo
- **\Litio** Pimozide
- * Risperidone

Di seguito, si allega quanto riportato all'art.1 pubblicato sulla GU n°164 del 15.07.2019 consultabile al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic azioneGazzetta=2019-07-15&atto.codiceRedazionale=19A04671&elenco30giorni=false

STRUTTURA: S.C. Farmaceutica Territoriale DIRETTORE f.f.: Dott.ssa Antonietta Barbieri

Tel.0161 593967 Fax.0161 593 922

e-mail: farmacia.territoriale@aslvc.piemonte.it

Determina:

Art. 1

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o piu' indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'Allegato P8 relativa all'uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per patologie del sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico, sono inseriti i seguenti medicinali con le relative indicazioni terapeutiche:

ARIPIPRAZOLO:

trattamento della schizofrenia a partire dall'eta' di tredici anni;

trattamento, fino a dodici settimane, degli episodi maniacali gravi o moderati nel contesto di una diagnosi del disturbo bipolare di tipo I in pazienti di eta' a partire dai dieci anni;

trattamento a breve termine (fino ad otto settimane) dell'irritabilita' in soggetti con disturbi dello spettro autistico che non abbiano risposto in modo efficace ad interventi psicologici specifici comportamentali ed educativi o per i quali tali interventi non sono disponibili (≥ sei anni);

sindrome di Tourette con una compromissione funzionale da moderata a grave (≥ sei anni);

PIMOZIDE:

sindrome di Tourette con compromissione funzionale da moderata a grave (≥ dodici anni);

RISPERIDONE:

trattamento a breve termine di problemi comportamentali di grado moderato o grave quali irritabilita' ed aggressivita' in soggetti (> cinque anni) con disturbi dello spettro autistico che non abbiano risposto in modo efficace ad interventi psicologici specifici comportamentali ed educativi o per i quali tali interventi non sono disponibili;

sindrome di Tourette con compromissione funzionale da moderata a grave (≥ sette anni);

add-on al metilfenidato in soggetti (≥ sette anni) ADHD e disturbo oppositivo-provocatorio, o aggressivita' che non abbiano risposto in modo efficace al solo trattamento con metilfenidato.