



A.S.L. VC
Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 593111 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

Pl. / Cod. Fisc. 01811110020

COSA FARE IN CASO DI UN ATTACCO D'ASMA

Gli attacchi d'asma di solito sono preceduti da segni di avvertimenti che anticipano di alcune ore la comparsa dei sintomi respiratori. Questi segnali variano da paziente a paziente e possono essere diversi di volta in volta anche nello stesso soggetto. Bisogna imparare a riconoscere i segni di avvertimento del paziente ed agire prontamente su di essi, in questo modo si potrà evitare attacchi d'asma molto gravi.

I principali segni di avvertimenti che anticipano la comparsa degli attacchi d'asma nel bambino sono: naso che cola, starnuti ripetuti e tosse secca insistente, soprattutto notturna. La tensione emotiva peggiora gli attacchi d'asma, per cui è fondamentale che i genitori rimangano calmi ed assicurino altrettanta tranquillità al bambino.

In caso di:

- Tosse notturna e/o risvegli
- Sibili o fischi
- Sintomi e/o affanno dopo sforzo
- Difficoltà a svolgere alcune attività

Somministrare:

Salbutamolo **puff con distanziatore**

La somministrazione può essere ripetuta ogni 20' per 3 volte

Se il bambino migliora continuare con le somministrazioni

4 volte al giorno per 3 giorni

3 volte al giorno per 3 giorni

2 volte al giorno per 3 giorni

In caso di:

- respiro affannoso
- tosse insistente
- agitazione

STRUTTURA: S.C. Pediatria

RESPONSABILE FF: Dott.ssa Elena Uga

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593454 - Fax +39 0161 593 294

E-mail: elena.uga@aslvc.piemonte.it

Pag. 1 di 3



A.S.L. VC
Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 593111 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 018111110020

- rientramenti intercostali e al giugulo
- impossibilità a svolgere le normali attività

Somministrare:

Salbutamolo puff con distanziatore

La somministrazione può essere ripetuta ogni 20' per 3 volte

Se i sintomi non migliorano nella prima mezzora di terapia somministrare un **cortisonico per via orale: Betametasona mg: cp**
(se necessario si può ripetere la somministrazione ogni 12-24 ore per 3-5 giorni)

Contattare il pediatra

Se il bambino non migliora o i sintomi peggiorano recarsi subito in Ospedale o chiamare il 118

I farmaci e le relative apparecchiature per somministrarli vanno tenuti sempre a portata di mano e condotti ovunque vada il paziente. Se si ha intenzione di allontanarsi da casa per un periodo di tempo superiore ai due giorni è meglio fare una scorta adeguata delle medicine necessarie.

Vercelli,

Il Medico