


REPORT

Riconoscimento dell'idoneità alla guida successiva a sospensioni delle patenti di guida ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada Nella ASL di Vercelli

Masturzo M., Troiano G., Barale A.
S.D.U. Osservatorio Epidemiologico – ASL VC

Fonte dati: Cotevino G., Roncarolo S., Vinzio M., Giorico F.
S.S.D. Medicina Legale – ASL VC



PREMESSA

Tra i principali comportamenti di guida pericolosi per la sicurezza stradale che determinano un consistente **allarme sociale ci sono quelli prodotti dall'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Codice della Strada sanziona tali comportamenti indipendentemente** dai danni eventualmente causati, in quanto li considera fonti di pericolo per beni fondamentali quali la vita, l'integrità fisica e la salute dei singoli e della collettività.

La guida sotto effetto di alcol o sostanze psicoattive (frequentemente associate con altri illeciti quali guida senza patente, guida distratta, eccesso di velocità, guida contromano, ecc.) è **un'importante causa di incidentalità stradale**.

L'art. 186 del CdS (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

La guida in stato di ebbrezza, oltre ad essere pericolosa, può costituire un reato. La Legge n.120 del 29 Luglio 2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", entrata in vigore il 13 agosto 2010, introduce, sanzioni più restrittive per chi guida in stato di ebbrezza e contiene una serie di novità relative alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Non esistono quantità di alcol sicure alla guida. Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell'idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. La legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un'autovettura, per i neopatentati di qualsiasi età e per i professionisti del volante.

Il limite legale del tasso alcolemico per la guida è 0,5gr per litro (L. n.120, 29/07/2010).

L'art. 187 del CdS (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) vieta la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo assunzione di sostanze stupefacenti (es. oppiacei, cocaina, cannabis, anfetamine, allucinogeni, ecc.) o psicotrope (es. benzodiazepine, barbiturici, ecc.). L'elenco delle sostanze è tassativo e fa riferimento alle tabelle allegate al D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i. Non è sufficiente provare che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope precedentemente al momento in cui si è posto alla guida, ma va dimostrato che guidava in stato di alterazione psico-fisica causato da tale assunzione.

L'esito positivo ai test rende legittimo il successivo accertamento tecnico che viene effettuato accompagnando il conducente presso strutture sanitarie per il **prelievo di campioni di liquidi biologici** per constatare la presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Questi accertamenti possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico.

Dato che l'obiettivo della visita in Commissione in caso di guida in stato di ebbrezza è quello di accertare la capacità da parte dell'interessato di comprendere i rischi che si corrono guidando sotto gli effetti dell'alcol, e di mantenere nel tempo tale consapevolezza, l'eventuale riconoscimento di idoneità potrà avere una durata limitata e dipendente dalla gravità della violazione commessa.

La Legge n. 177 del 25 novembre 2024, "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto sanzioni ancora più restrittive rispetto alla normativa precedente per chi guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre che per chi usa il cellulare alla guida¹.

¹ Fonti:

Ministero della Salute - "Alcol e guida, cosa dice la legge":

<https://www.salute.gov.it/new/it/tema/alcol/alcol-e-guida-cosa-dice-la-legge/?paragraph=0>

Regione Piemonte: "Tabella tasso alcolemico":

<https://www.salute.gov.it/portale/alcol/dettaglioContenutiAlcol.jsp?lingua=italiano&id=2359&area=alcol&menu=vuoto>

Regione Piemonte "Sostanze alcol e guida":

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/dipendenze/sostanze-alcol-guida>

Gazzetta Ufficiale: "Legge n. 177 del 25 novembre 2024


<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/29/24G00199/SG>

Riconoscimento dell'Idoneità alla Guida successivo a Sospensione della Patente ai Sensi degli Art. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nel 2024, presso la S.S.D. Medicina Legale della ASL di Vercelli, le Commissioni incaricate dei controlli per il riconoscimento delle idoneità alla guida, successive a sospensioni delle patenti ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della strada, hanno raccolto importanti informazioni per dimensionare il fenomeno della guida sotto l'influenza di alcol e/o di sostanze psicoattive nella ASL di Vercelli e anche se circa il 25% dei controlli è stato effettuato per residenti in altre ASL limitrofe (ASL BI, TO4, Città di Torino, AL, NO e VCO), nei periodi in cui presso tali ASL risultava temporaneamente inattiva la Commissione di controllo, è stato però possibile effettuare solo un'analisi cumulativa dei dati.

Complessivamente nel corso del **2024**, nella ASL di Vercelli, sono stati effettuati **1.173 controlli**, 647 (55% del totale) presso la sede della Medicina Legale Vercelli, appartenente all'area territoriale sud e 526 (45% del totale), presso la sede della Medicina Legale di Borgosesia, appartenente all'area territoriale nord (Grafico 1.).

Grafico 1. Asl di appartenenza soggetti controllati per sospensione patente di guida – ASL VC 2024



Dei 1.173 controlli effettuati, **882 soggetti sono risultati appartenenti all'ASL di Vercelli (75.2%)**, di cui 477 (54%) presso la sede di Vercelli, 405 (46%) presso la sede di Borgosesia.

Le analisi che seguono sono effettuate sui soli soggetti appartenenti all'ASL di Vercelli.

In entrambe le aree territoriali, predomina la percentuale maschile infatti nell'area territoriale sud meno del 10% delle persone a cui è stata sospesa la patente è rappresentato da donne, mentre nell'area territoriale nord la percentuale di donne sale di poco ed è pari al 14% (Grafico 2).

Grafico 2. Sospensione patente di guida stratificata per genere nelle Aree territoriali della ASL VC





Grafico 3. Controlli post sospensione patente di guida conseguente alla guida in stato di ebrezza e/o uso di sostanze stupefacenti – ASL VC Anno 2024



Nell'anno preso in esame, sia fra gli uomini sia fra le donne quasi la metà delle sospensioni di patente di guida si è verificata fra i 30 e i 49 anni d'età. Si osserva una maggior discrepanza tra i due sessi nelle fasce di età relative a <29 anni e tra i 50-69 anni; le donne risultano essere maggiormente rappresentate sotto i 29 anni di età (28% versus 21%), mentre gli uomini sono presenti in percentuale maggiore tra i 50-69 anni (30% versus 22%).

Per tutti i soggetti valutati fra i 18 e i 49 anni d'età si verificano più dei due terzi delle sospensioni complessive (Grafici 4 e 5).

Grafico 4. Distribuzione per fasce d'età della sospensione della patente di guida fra gli Uomini - ASL VC





Grafico 5. Distribuzione per fasce d'età della sospensione della patente di guida fra le donne - ASL VC



Fra gli uomini la frequenza dei consumatori di alcol, fra coloro che incorrono nella sospensione, aumenta con il crescere dell'età e al diminuire della frequenza di coloro che incorrono nella sospensione per assunzione di sostanze stupefacenti, che sono il 32% fra i ≤29 anni e che decrescono gradualmente fino all'11% circa fra i 50-69enni, fino ad azzerarsi fra gli over 70enni. La sospensione per assunzione contemporanea di alcol e di sostanze si è rilevata nel 5% dei ≤29 anni e dei 30-49enni per scendere al 3% dei 50-69enni fino ad azzerarsi fra gli over 70enni. (Grafico 6).

Anche fra le donne il principale motivo di sospensione della patente di guida è l'assunzione di alcol; anche in questo caso la frequenza delle consumatrici di alcol aumenta con il crescere dell'età e al diminuire della frequenza di coloro che incorrono nella sospensione per assunzione di sostanze stupefacenti che si azzerano fra le over 70enni. La sospensione per assunzione contemporanea di alcol e di sostanze si rileva solo nella fascia d'età <29 anni, pari al 4% (Grafico 7).

Grafico 6. Motivi di sospensione della patente per fasce d'età fra gli uomini - ASL VC 2024





Grafico 7. Motivi di sospensione della patente per fasce d'età fra le donne - ASL VC 2024



Le tabelle da 1 e 2 riportano come l'assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti, che hanno portato alla sospensione della patente di guida, risultano distribuite per fasce d'età fra gli uomini e fra le donne. Le stesse informazioni sono rappresentate nei grafici 8 e 9.

Gli uomini fermati per guida sotto gli effetti dell'alcol nel 2024 sono risultati 594, fra questi il 18% (106) aveva fra i 18 e i 29 anni, il 44% (263) aveva fra i 30 e i 49 anni, il 34% (202) aveva tra i 50 e i 69 anni e il 4% (23) 70 e più anni (Tabella 1).

Tabella 1. Sospensioni per assunzione di alcol e di sostanze per fasce d'età - Uomini - Anno 2024

2024	Sospensioni uomini								
Fasce d'età	<29	%	30-49	%	50-69	%	>70	%	Totale
Alcol	106	18%	263	44%	202	34%	23	4%	594
Sostanze	53	34%	76	49%	27	17%	0	0%	156
Alcol e Sostanze	8	24%	19	58%	6	18%	0	0%	33
Totale	167	21%	358	46%	235	30%	23	3%	783

Le donne fermate per guida sotto gli effetti dell'alcol nel 2024 sono risultate 79, fra queste il 24 % (19) aveva fra i 18 e i 29 anni, il 51% (40) aveva fra i 30 e i 49 anni, il 24% (19) aveva tra i 50 e i 69 anni e l'1% (1) 70 e più anni (Tabella 2).

Tabella 2. Sospensioni per assunzione di alcol e di sostanze per fasce d'età - Donne - Anno 2024

2024	Sospensioni donne								
Fasce d'età	<29	%	30-49	%	50-69	%	>70	%	Totale
Alcol	19	24%	40	51%	19	24%	1	1%	79
Sostanze	8	42%	8	42%	3	16%	0	0%	19
Alcol e Sostanze	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	1
Totale	28	28%	48	49%	22	22%	1	1%	99

I soggetti fermati per guida dopo assunzione di sostanze in numero assoluto sono molto inferiori a quelli fermati per assunzione di alcol, ma rispetto all'assunzione di alcol sono più frequenti nella fascia d'età fra i 18 e i 29 anni.

Grafico 8. Sospensioni per assunzione di alcol e di sostanze per fasce d'età - Uomini – ASL VC 2024




Grafico 9. Sospensioni per assunzione di alcol e di sostanze per fasce d'età - Donne – ASL VC 2024





Grafico 10. Professione dei soggetti con sospensione della patente per assunzioni a rischio - ASL VC 2024



Conclusioni

Questo breve report ha analizzato i dati relativi ai soggetti appartenenti all'ASL di Vercelli a cui, nell'anno 2024, è stata disposta un'ordinanza di sospensione della patente di guida per alterazione psicofisica derivata dall'assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope; da questi dati è emerso che le 882 sospensioni rilevate in circa il 90% dei casi sono a carico di uomini e sono state causate prevalentemente dal consumo di alcol.

Più della metà delle sospensioni totali si sono verificate fra i 18 e i 49 anni d'età sia fra gli uomini sia fra le donne e la fascia d'età 30-49 anni è quella più interessata.

Le sospensioni per assunzione di alcol sono le più frequenti ma fra le persone più giovani risultano rilevanti anche le sospensioni per assunzione di sostanze stupefacenti, infatti fra i 18 e i 29 anni rappresentano circa il 30% del totale.

La numerosità delle persone con sospensione della patente di guida nella fascia d'età over 70 è molto ridotta rispetto alle altre fasce d'età considerate ed è causata quasi esclusivamente dall'assunzione di alcol.

Si sottolinea l'importanza che i datori di lavoro dei professionisti della guida dispongano tutti i controlli necessari per accertare che sia rispettato il divieto di assunzione di alcol e sostanze perché si è riscontrato ben il 3% dei casi di sospensione della patente per guida sotto l'effetto dell'alcol a carico dei professionisti della guida per i quali, ai fini dell'idoneità psicofisica, la legge impone che la concentrazione di alcol nel sangue sia pari a zero grammi per litro.

E' anche molto importante attenzionare i comportamenti alla guida della popolazione più giovane che, in aggiunta, oltre all'alcol assume in proporzione più sostanze stupefacenti o psicotrope rispetto alle fasce d'età adulte e fra i giovani ci sono sicuramente più soggetti neopatentati in cui la normativa impone che la concentrazione di alcol nel sangue debba essere di zero grammi per litro.

Perciò si rendono opportuni frequenti controlli da parte delle Forze dell'Ordine e controlli sistematici con l'etilotest, strumento di provata efficacia nella riduzione della mortalità da incidente stradale.

Le persone della ASL di Vercelli che nel 2024 sono state sottoposte a sospensione della patente di guida ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della strada, rispetto alla popolazione generale della ASL risultano circa lo 0,5%, ma chiaramente non si è in grado di stimare le reali dimensioni del fenomeno della guida sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'eventuale e ipotetico sommerso deriverebbe da una più o meno frequente effettuazione dei controlli che non è di competenza della sanità pubblica.

Gli interventi di prevenzione e promozione della salute disposti in sanità pubblica per il contrasto e la prevenzione del fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica sono di seguito descritti.

Con il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, declinato a livello locale nel Piano Locale di Prevenzione, è stata messa in campo un'azione per la "promozione della guida responsabile" e nella ASL di Vercelli è in corso un progetto denominato "Spotnight", per informare e sensibilizzare su una guida consapevole e responsabile, nei luoghi di divertimento notturno, il coordinamento del progetto è affidato ad una cooperativa composta da esperti in interventi di outreach per la riduzione del danno.

A livello regionale nel 2025 sono stati realizzati degli opuscoli informativi denominati "Alcol-Imparare a conoscerlo", in cui sono riportati gli effetti dell'alcol, del Binge drinking e del mix di sostanze sull'organismo, e sono descritte le sanzioni per abuso di alcol alla guida e per positività alle sostanze stupefacenti. Gli opuscoli sono stati consegnati alle Prefetture per la distribuzione in occasione dell'emissione delle Ordinanze di sospensione provvisoria della patente per guida, alle Strutture di Medicina Legale per la distribuzione in occasione del rilascio della patente di guida dopo sospensione temporanea e anche agli Ordini degli Avvocati, affinché gli iscritti possano distribuirli ai propri assistiti cui siano state applicate Ordinanze di sospensione provvisoria della patente per guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.

SANZIONI

TASSO ALCOLEMICO 0 - 0,5 G/L

PER NEOPATENTATI (PRIMI 3 ANNI DI PATENTE)
SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 168 A EURO 678
(RADDOPPIATA SE PROVOCA INCIDENTE)
DECURTAZIONE PUNTI: 5

TASSO ALCOLEMICO > 0,5 E < 0,8 G/L

SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 800 A EURO 3200
(AUMENTA DA 1/3 A 1/2 PER NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI)
SOSPENSIONE PATENTE: DA 6 A 12 MESI
DECURTAZIONE PUNTI: 10
ARRESTO: FINO A 6 MESI
FERMO VEICOLO
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ALCOL LOCK

TASSO ALCOLEMICO > 0,5 E < 0,8 G/L

SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 543 A EURO 2170
(AUMENTA DI 1/3 PER NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI)
SOSPENSIONE PATENTE: DA 3 A 6 MESI
DECURTAZIONE PUNTI: 5

TASSO ALCOLEMICO > 1,5 G/L

SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 1500 A EURO 6000
(AUMENTA DA 1/3 A 1/2 PER NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI)
SOSPENSIONE PATENTE: DA 12 A 24 MESI. RADDOPPIA SE IL VEICOLO È DI UN'ALTRA PERSONA
DECURTAZIONE PUNTI: 10
ARRESTO: DA 6 A 12 MESI
FERMO VEICOLO
CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ALCOL LOCK

*POSITIVITÀ ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI

SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 1.500 A EURO 6.000
RADDOPPIA SE IL VEICOLO È DI UN'ALTRA PERSONA.
ARRESTO: DA 6 A 12 MESI
SOSPENSIONE PATENTE: DA 12 A 24 MESI.
DECURTAZIONE PUNTI: 10
CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA.

PENE PIÙ SEVERE DALLE 22 ALLE 07

*PER POSITIVITÀ SI INTENDE SOLO LA POSITIVITÀ AL TEST E NON UN COMPROVATO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA.



ALCOL - IMPARARE A CONOSCERLO

QUESTO VOLANTINO NASCE PER INFORMARE LE PERSONE CHE SONO STATE SANZIONATE IN SEGUITO AD UN CONSUMO ECCEDENTE I VALORI CONSENTITI DI ALCOL ALLA GUIDA.

L'ALCOL È UNA SOSTANZA CHE DEPRIME IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.

INIZIALMENTE PROVOCA UN SENSO DI RELAX E DI LEGGEREZZA FISICA E MENTALE, MAGGIOR FIDUCIA IN SE STESSI, AUMENTO DELLA CAPACITÀ COMUNICATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE, PERDITA PROGRESSIVA DELLE INIBIZIONI, FACILITÀ AL RISO E AL SENSO DI ALLEGRIA, ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DEI PROPRI PROBLEMI E DIMINUZIONE DEL SENSO DI TIMORE, ANSIA E PAURA.

INQUADRA QUI CON IL TUO SMARTPHONE
SE VUOI CONOSCERE I SERVIZI CHE SI
OCCUPANO DI ALCOL VICINO A TE!



COS'HAI
BEVUTO?

2 BICCHIERI DI VINO
2 BIRRE PICCOLE
2 SHOT DI LIQUORE

TASSO
ALCOLEMICO

0,4G/LITRO

COME TI
SENTI?

L'ALCOL STA GIÀ AVENDO
UN IMPATTO, MA NON SI
PERCEPISCE CHIARAMENTE

3 BICCHIERI DI VINO
3 BIRRE PICCOLE
3 SHOT DI LIQUORE

0,5G/LITRO

SI SOTTOVALUTANO I
PERICOLI
RIFLESSI RALLENTATI DEL
30%

5 BICCHIERI DI VINO
3 BIRRE PICCOLE
5 SHOT DI LIQUORE

0,8G/LITRO

DIFFICILE PERCEPERE I
PERICOLI LATERALI (VISIONE
A TUNNEL) E TEMPI DI
REAZIONE COMPROMESSI

7 BICCHIERI DI VINO
5 BIRRE PICCOLE
6 SHOT DI LIQUORE

1,5G/LITRO

VISIONE DOPPIA SFOCATA,
MANCATA
COORDINAZIONE DEI
MOVIMENTI

BINGE DRINKING

BERE GRANDI QUANTITÀ DI ALCOLICI IN BREVE TEMPO PUÒ CAUSARE SURRISCALDAMENTO O ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SONNO PROFONDO, DEPRESSIONE RESPIRATORIA E COMA. QUESTA MODALITÀ ESPONE AD UN RISCHIO MAGGIORE DI DANNI.

RICORDATI CHE SE HAI BEVUTO ALCOL, NON ESISTONO STRATAGEMMI PER FAR CALARE L'ALCOLEMIA RAPIDAMENTE IN PREVISIONE DI UN CONTROLLO CON L'ETILOMETRO E CHE NON ESISTONO LIVELLI SICURI DI ALCOL ALLA GUIDA.

SE SI BEVE UN BICCHIERE DI QUALSIASI BEVANDA ALCOLICA, SI INGERISCONO IN MEDIA 12 GRAMMI DI ALCOL: 12 GRAMMI DI ALCOL DETERMINANO IN MEDIA UN'ALCOLEMIA PARI A 0,2 GR/LT, CHE VARIA DA PERSONA A PERSONA, ESSENDO INFLUENZATA DA PESO, LIQUIDI CORPOREI, GENERE, STOMACO PIENO O VUOTO. IL FEGATO IMPIEGA 2-3 ORE PER RIPORTARE A ZERO L'ALCOLEMIA CORRISPONDENTE A 1 BICCHIERE DI BEVANDA ALCOLICA. VA SOTTOLINEATO CHE LE RAGAZZE, A PARITÀ DI CONSUMO, SONO PIÙ VULNERABILI DEI RAGAZZI, RAGGIUNGONO PIÙ VELOCEMENTE LIVELLI ELEVATI DI ALCOLEMIA E SMALTISCONO L'ALCOL MOLTO PIÙ LENTAMENTE. PER QUESTO È MOLTO IMPORTANTE CONOSCERE GLI EFFETTI DI LIVELLI CRESCENTI DI ALCOLEMIA SULL'ORGANISMO E LE SANZIONI A CUI SI VA INCONTRO IN CASO DI INFRAZIONE AI LIMITI VIGENTI.

MIX DI SOSTANZE

GLI EFFETTI DEL CONSUMO COMBINATO DI PIÙ SOSTANZE SONO DIFFICILI DA PREVEDERE E NON SONO LA SOMMA DEGLI EFFETTI DELLE SINGOLE SOSTANZE. LA COMBINAZIONE DI DUE O PIÙ SOSTANZE ENTRO BREVE TEMPO E DURANTE UNA NOTTATA, ESPONE L'ORGANISMO E LA PSICHE A SOLLECITAZIONI ESTERNE ED AUMENTA IL RISCHIO DI CONSEGUENZE NEGATIVE. SPIACEVOLMENTE PER QUESTO È IMPORTANTE SAPERE QUALI SONO GLI EFFETTI E I RISCHI A CUI SI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL MOMENTO IN CUI DROGHE ED ALCOL VENGONO MISCOLATI INSIEME.

ALCOL + CANNABIS

PUÒ DANNEGGIARE I PROCESSI COGNITIVI

ALCOL + COCAINA

PRODUCE UNA SOSTANZA DEFINITA COCAETILENE CHE AUMENTA IL RISCHIO DI MORTE, PUÒ CAUSARE ATTACCHI CARDIACI, POTENZIA LA MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE, CAUSA PERDITE DELLE INIBIZIONI E AUMENTO DELL'AGGRESSIVITÀ

ALCOL + AMFETAMINA/ECSTASY

POTENZIA GLI EFFETTI NEGATIVI E SORDEVOLI DELL'ALCOL, CAUSA PERDITE DELLE INIBIZIONI E AUMENTO DELL'AGGRESSIVITÀ

ALCOL + KETAMINA

PROVOCA NAUSEA E VOMITO. PUÒ CAUSARE PERDITA DI CONSCENZA E/O ARRESTO CARDIACO. PUÒ PROVOCARE BLOCCO RESPIRATORIO

ALCOL + OPIACEI

AUMENTA GLI EFFETTI DEPRESSIVI DEGLI OPIACEI, RALLENTA LA RESPIRAZIONE E IL RITMO CARDIACO CON RISCHIO DI MORTE

ALCOL + FARMACI

L'ALCOL PUÒ POTENZIARE O DEPOTENZIARE L'EFFETTO DEI FARMACI AUMENTANDO IL RISCHIO DI EFFETTI COLLATERALI FINO A COMPROMETTERE LE FUNZIONI VITALI. SE STAI ASSUMENDO FARMACI CHIEDI AL TUO MEDICO SE È POSSIBILE ASSUMERE ALCOOLICI

SE VUOI ESSERE RELATIVAMENTE
SICURO DEL TUO TASSO ALCOLEMICO
MISURALO CON UN ALCOL TEST E NON
FIDARTI DELLE TUE SENSAZIONI...
PORTA CON TE UN ALCOLTEST MONOUSO.